

Pour ce mois 69 000 données ont été transmises, contre 88 000 il y a un an. C'est très curieux, mais nous n'avons pas cherché à connaître la cause de ce recul qui dure depuis plusieurs mois.

Au total 195 espèces sauvages ont été notées, dont 31 ne sont pas nicheuses. À noter quelques espèces rares : un Fuligule nyroca, 2-3 Crabiers chevelus, plusieurs Ibis falcinelles, une Spatule blanche, un pluvier guignard, un Bécasseau sanderling, un de Temminck, un Coucou-geai, ...

Soulignons enfin la progression lente de la Bouscarle de Cetti, de la Cisticole des joncs et de la Fauvette mélanocéphale, alors que l'Elanion blanc n'a pas progressé depuis son arrivée très remarquable.

### Tadorne de Belon : 2 données,

3 oiseaux, 2 sites, début mai. Ensuite, du 15 mai au 15 octobre, l'espèce sera très rare.

### Nette rousse : 54 données,

Toujours très localisées : un site en Haute-Loire, le centre du Puy-de-Dôme et un couple dans l'Allier. Pas de reproduction notée, mais 2 poussins dans une nichée de colverts (P. Chaud) à l'Écopole (63).

### Fuligule nyroca :

Une femelle à Talizat (15) en mai. C'est exceptionnel. Il n'y a que 115 données au total dans Faune-Auvergne.

### Grèbe à cou noir :

2 oiseaux à Valigny (03) (R. Tavard).

### Crabier chevelu : 6 données,

3 sites, peut-être 3 oiseaux. Le pic de présence en Auvergne est fin avril-mai.

### Héron pourpré : 49 données,

17 sites, tous des oiseaux de passage ou erratiques.

### Ibis falcinelle : 4 données,

6 oiseaux, 3 sites. C'est une espèce encore très rare en Auvergne : total de 49 données. Voir la fiche espèce.

### Spatule blanche :

Une début mai près de Thiers (63). Espèce rare en Auvergne : 116 données, surtout en mai. Voir la fiche espèce.

### Elanion blanc : 6 données,

5-6 oiseaux notés, c'est peu ! Et pas de nidification constatée !

### Vautour moine : 7 données,

Il y a en moyenne 7-8 oiseaux en mai chaque année. Nombre de données habituel donc.

### Busard des roseaux : 41 données,

Belle série de données, tous des oiseaux de passage.

### Busard cendré : 568 données,

Recherches assidues en zones cultivées.

### Aigle royal : 5 données,

Noté sur 4 sites dans le sud de l'Auvergne. Classique.

### Faucon kobez : 29 données,

Très belle série de données. Présence très irrégulière d'une année sur l'autre. Noté surtout dans le Cantal, avec peu d'oiseaux, mais un stationnement notable des oiseaux observés.

### Echasse blanche : 15 données,

C'est une belle série de données. 4 sites et une dizaine d'oiseaux.

### Pluvier guignard :

Un le 24 mai en Limagne (Th. Lyon). Très rare en mai : seulement 9 données pour ce mois dans Faune-Auvergne.

### Bécasseau sanderling :

Un le 5 mai dans la RNVA (S. Lovaty). Passe au printemps et à l'automne, mais très rare : 86 données seulement dans Faune-Auvergne.

### Bécasseau de Temminck :

Un les 10-11 mai à Lempdes (43). (R. Riols et A. Crégu). Espèce très rare aussi.

### Chevalier arlequin :

Un le 2 mai à Lempdes (43) (C. Calmel).

### Mouette mélanocéphale : 5 données,

3 sites, environ 10 oiseaux. Notée surtout au printemps.

### Mouette pygmée :

Une le 15 mai à Prémilhat (03) (A. Trompat). Fin du passage de printemps.

### Guifette moustac : 6 données,

4 sites, 8 oiseaux. Ne passe qu'au printemps.

### Guifette noire : 22 données,

Notée sur 6 sites, c'est peu. Visible aux 2 passages.

### Coucou-geai :

Un le 5 mai dans le Cantal (M. Pélissié). Sous réserve d'homologation. Voir la fiche espèce. Très rare : 32 données dans Faune-Auvergne.

### Petit duc scops : 31 données,

Surtout dans le Puy-de-Dôme, mais 4 sites dans la Haute-Loire et un dans l'Allier.

### Pipit rousseline :

Un le 14 mai à Cournon (63) (R. Riols). Fin du passage. Il y a 50 données en mai dans Faune-Auvergne.

### Pipit à gorge rousse : 2 données,

2 oiseaux début mai dans le Cantal. Passe en avril-mai. Il y a 134 données dans Faune-Auvergne.

### Bergeronnette printanière : 530 données,

À noter : 23 données de nordiques, une de favéole, 3 ibériques, 7 centre-atlantiques.

### Accenteur alpin :

Un à Chastreix-63, le 3 mai (C. Fridlender).

### Monticole de roche : 35 données,

Curieux, une forte chute des données en mai ces dernières années.

### Merle à plastron : 37 données,

Même commentaire.

### Bouscarle de Cetti : 7 données,

4 sites, dont 3 dans l'Allier et un dans le Puy-de-Dôme. Que des chants pour l'instant.

### Cisticole des joncs : 34 données,

Au moins 8 sites. Chiffre record pour ce mois. L'espèce semble s'adapter à l'Auvergne !

### Fauvette mélanocéphale : 5 données,

3 sites, dont un en Haute-Loire, avec environ 5 mâles ; Il y a maintenant 84 données dans Faune-Auvergne. Voir l'article de Brugerolle et Saulas dans la revue le Grand-Duc.

### Pie-grièche à tête rousse : 34 données,

C'est une petite série de données : Cantal et Allier, plus un oiseau en halte migratoire le 9 mai dans le Puy-de-Dôme (L. Maly).

### Pie-grièche grise : 184 données,

C'est une belle série de données, suite aux recherches de passionnés. Voir le rapport de S. Nottelet et F. Magnard, qui estiment à 2360 individus la population du Massif central.

**Moineau Soulcie : 25 données,**  
C'est une petite série. Présence dans 3 départements, mais pas dans l'Allier.

**Venturon montagnard : 5 données,**  
Données groupées dans le sud de la Haute-Loire.

**Bruant ortolan : 43 données,**  
Toutes dans le Puy-de-Dôme. L'espèce disparaît peu à peu, suivie par quelques passionnés.

J.P. Dulphy – 12 juin 2023



Héron pourpré – Auteur non diffusé



Fauvette mélanocéphale  
Catherine Calmel



Faucon kobez - Éliane Manière