

L'EFFRAIE

La revue du CORA - Rhône

n° 28 - 2010



Grande Aigrette D. Tissier, Camargue 20/02/2010

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Section Rhône

M.R.E. 32 rue Sainte-Hélène 69002 LYON

Tél. : 04 72 77 19 85 Fax. : 04 72 77 19 86

cora69@wanadoo.fr


www.corafaunesauvage.fr



CORA-Rhône

ISSN 0982-5878

Editorial



L'énergie solaire est l'énergie primaire source de toute vie et de tout ce qui existe sur notre planète. Les sages de l'antiquité l'avaient-ils compris quand ils choisirent comme dieu, parfois unique, dieu créateur du monde et de la vie, le soleil, tel Utu à Sumer, Râ dans l'Egypte antique ou, plus récemment, Huitzilopochtli pour les aztèques et Inti, l'ancêtre des empereurs incas ?

Aujourd'hui, la science nous a permis de comprendre la formation des planètes autour de notre étoile, le rôle du soleil dans l'évolution de la Terre, puis la création de la vie grâce à la photosynthèse qui gouverne le fonctionnement des cellules végétales élémentaires.

Nos sources d'énergie modernes viennent, elles-aussi, du soleil, puisque les hydrocarbures ont été créés par la fossilisation, il y a 320 millions d'années, des grandes forêts du Carbonifère ! Les centrales hydroélectriques utilisent l'eau des fleuves, elle-même issue des pluies dues à l'évaporation de l'eau de mer, donc à la chaleur du soleil ! Le vent qui fait tourner les éoliennes (ou les moulins à vent d'autrefois) est dû aux différences de pression et de température des masses d'air chauffées par le soleil. Même les matières fissiles, comme l'Uranium 235 utilisé dans nos réacteurs nucléaires, ont été créés à partir des éléments plus légers issus des étoiles.

Et l'électricité, source d'énergie moderne, dont on ne saurait plus se passer et trop souvent présentée comme une énergie « propre », est obtenue à partir des hydrocarbures (gaz, fuel), du charbon, de l'Uranium, des barrages ou des éoliennes.

Depuis une soixantaine d'années, on sait pourtant transformer directement l'énergie du soleil en électricité grâce aux panneaux photovoltaïques. La découverte par BECQUEREL en 1839 de l'effet photovoltaïque a conduit en effet, lorsque les techniques de fabrication des cellules électroniques à base de semi-conducteurs comme le Silicium furent mises au point, à la construction des premiers panneaux solaires utilisés, dès 1958, pour alimenter en énergie les satellites envoyés dans l'espace.

Le fort développement de cette source d'énergie depuis quelques années a été dû principalement à des incitations fiscales ou des aides financières, preuve malheureusement que la protection de notre planète n'est pas suffisamment incitative, à elle seule, aux yeux de la majorité dite silencieuse. L'énergie solaire ne représente que de l'ordre de 0,1% de l'énergie électrique mondiale. En Europe, le Parlement européen a défini un objectif de 20% d'énergie renouvelable en 2020 (principalement d'origine hydraulique et éolienne), soit seulement 2% d'énergie solaire.

On voit aujourd'hui les lobbies économiques du pétrole tirer sur le frein pour sauvegarder leurs intérêts financiers ! Pourtant, la disparition inéluctable, même si sa date n'est pas connue précisément, des ressources fossiles, devrait nous conduire inexorablement vers ces énergies dites renouvelables !

On a calculé que, pour produire l'énergie électrique consommée par an par la population française, soit environ 500TWh, soit 500 milliards de kWh, il faut 5 000km² de panneaux photovoltaïques. Chiffre astronomique ? Non, puisque cela ne représente que moins de 1% du territoire (543 965km² en métropole) et environ la moitié des surfaces de toitures actuelles ! La difficulté reste le stockage de l'énergie électrique (qu'on ne sait pas encore résoudre de façon économiquement et écologiquement intéressante - les batteries sont beaucoup trop lourdes, chères et polluantes si elles ne sont pas correctement recyclées) puisque le soleil est intermittent alors que notre consommation est continue.

Des solutions sont à l'étude comme la fabrication, à partir de bactéries utilisant la biomasse, d'hydrogène que l'on peut ensuite utiliser dans des piles à combustible ; ou le pompage ou la compression diurne d'eau ou de gaz ; ou le stockage de chaleur dans des sels ou des huiles ; d'autres sont à inventer !... L'homme devra donc faire preuve encore d'inventivité pour disposer de plus en plus d'énergie, s'il ne renonce pas à tous ses gaspillages inutiles !

Le rédacteur en chef



Sommaire du n°28/2010

Editorial	p. 2
La Grande Aigrette, phénologie du passage dans le Rhône <i>Dominique TISSIER</i>	p. 4
Un Pluvier argenté en Val-de-Saône et quelques observations autour de la gravière de Joux (2004 à 2009) <i>Jean-Paul RULLEAU</i>	p.12 p.14
Le CORA à la découverte du littoral : Manche et Mer d'Iroise • LA MANCHE (26/09 au 2/10/2009) • OUESSANT (3/10 au 11/10/2009) <i>Jean-Paul RULLEAU</i>	p.16 p.16 p.21
Le rassemblement d'Oedicnèmes criards de Saint-Priest en 2009 <i>Cyrille FREY</i>	p.26
INFO ORNITHO :	p.30
Un nouveau nichoir pour les Faucons pèlerins à la Part-Dieu	p.30
L'hiver 2009-10 et ses oiseaux à Miribel-Jonage, Anse et ailleurs...	p.31
Une Harelde boréale séjourne longuement dans le Rhône	p.33
Un Pic mar au Parc de Lacroix-Laval	p.35
Les chroniques départementales mensuelles du Rhône en 2009	p.37

EFFRAIE n°28 / 2010

Revue éditée par le CORA-Rhône (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, section Rhône)

32 rue Sainte-Hélène 69002 LYON

☎ 04 72 77 19 85 FAX : 04 72 77 19 86 email : cora69@wanadoo.fr

<http://www.corafaunesauvage.fr/>

Edition et publication : CORA-Rhône

Rédacteur en chef : Dominique TISSIER

Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu relire et corriger les articles de ce numéro : Annie PINGET, Jonathan JACK, Jean-Paul RULLEAU, Pierre-Yves JUILLET, Jean-Michel BELIARD, Rémi RUFER.

Photo de couverture : Grande Aigrette / Dominique TISSIER.

Photos intérieures : Jean-Paul RULLEAU, Hubert POTTIAU, Gilles CORSAND, Dominique TISSIER, Jean-Michel BELIARD, Guy BOURDERIONNET et Jules FOUARGE.

Illustrations : Dominique TISSIER, Magalie DUBOIS.

Réalisation et mise en page : Dominique TISSIER

Reprographie et reliure : COREP Lyon

Les opinions exprimées dans les articles de cette revue n'engagent que leur auteur et non le CORA.

Pour toutes publications, contacter le Rédacteur en chef : dominique.tissier@ecam.fr ou le CORA-Rhône.

La Grande Aigrette :

phénologie du passage dans le Rhône

Dominique TISSIER

Grand héron blanc de la famille des ardéidés, ordre des ciconiiformes, la Grande Aigrette *Casmerodius albus* n'est visible dans le département du Rhône que pendant la saison hivernale et lors de rares passages migratoires. L'espèce est en nette progression ces dernières années partout en France et les données départementales sont également beaucoup plus nombreuses en 2009 et 2010 que par le passé. Il nous a semblé intéressant de faire le point sur les citations relatives à cette espèce enregistrées dans la base de données du CORA.



Description

D'une taille d'environ 85 centimètres jusqu'à 1 mètre, cet oiseau est très facile à identifier par sa silhouette élancée et son allure typique de héron, mais aussi par la coloration entièrement blanche du plumage (MULLARNEY, SVENSSON, ZETTERSTRÖM & GRANT 1999). En France, l'espèce ne peut pas être confondue, si ce n'est avec un éventuel et peu probable Héron cendré *Ardea cinerea* albinos. Son cou est plus long que celui du Héron cendré, de même que ses pattes, ce qui lui donne un aspect beaucoup plus élancé, voire disproportionné quand elle étire son corps verticalement.

☞ Ci-contre : Grande Aigrette sur la route du Mas d'Agon en Camargue (D.TISSIER 2010).

L'Aigrette garzette *Egretta garzetta* est presque deux fois plus petite, de 55 à 65 centimètres, quoique, parfois à distance et sans comparaison directe, l'hésitation peut être possible ! Lorsque les deux espèces sont côte à côte, la différence est flagrante !

Les pattes sont très sombres, quasi noires ou noir verdâtre, sauf les « tibias » jaunâtre plus ou moins clair, plus rougeâtres pendant la période des parades nuptiales. A noter que les doigts ne sont pas jaunes, contrairement à ceux de l'Aigrette garzette. Le bec, en forme de poignard typique des ardéidés, est entièrement jaune, avec parfois l'extrémité un peu sombre, sauf pour les oiseaux reproducteurs qui ont alors au printemps le bec noir avec un peu de jaune à la base. Les commissures du bec se terminent en un trait noir qui va nettement en arrière de l'œil. L'iris de l'œil est jaune. De même, les lores sont jaunâtres. Pendant la saison des parades nuptiales, l'oiseau arbore de longues aigrettes blanches aux scapulaires qui peuvent atteindre 50 centimètres (BROWN, FERGUSON, LAWRENCE & LEES 2005), mais aucune sur le cou. Ces longues plumes étaient très recherchées autrefois pour orner les costumes et chapeaux des femmes.

La femelle ne peut être distinguée par l'apparence.

En vol, le cou est replié comme pour le Héron cendré et la plupart des ardéidés, les ailes paraissent longues et larges, arquées lors des planés. L'envergure est de 1,4 à 1,7m. Les coups d'ailes sont lents et lourds. On s'attachera surtout à noter la longueur des pattes qui dépassent nettement plus que chez l'Aigrette garzette, ainsi que la « bosse » inférieure, en forme d'étrave de bateau, faite par le cou replié, qui est aussi nettement plus marquée que celle présentée par la garzette, alors qu'elle est quasi absente chez le Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*, autre ardéidé entièrement blanc.

Les oiseaux observés dans le Rhône sont quasiment toujours silencieux.



Grande Aigrette et Aigrette garzette (D.TISSIER Camargue 2010).
 Noter la différence de taille facile à apprécier quand les deux espèces sont côte à côte.

Alimentation

La Grande Aigrette se nourrit de poissons, d'insectes et de petits vertébrés aquatiques et terrestres. Elle chasse poissons et batraciens, à l'affût, souvent immobile, comme le Héron cendré, mais peut aussi pêcher en avançant, comme l'Aigrette garzette, ou agiter l'eau d'une patte pour faire bouger ses proies. La victime est alors transpercée d'un coup de bec adroit et extrêmement rapide ! On la voit aussi, mais moins souvent que le Héron cendré, sur des zones agricoles où elle capture de petits mammifères, mulots ou campagnols, ou des batraciens.

Aire de répartition et expansion

La Grande Aigrette niche dans tous les continents, plutôt dans les régions chaudes ou humides, tropicales et équatoriales. On distingue quatre sous-espèces, différenciées par la coloration des zones nues, tarses, lores et bec. La sous-espèce type *C. a. albus* niche en Europe et Asie centrale. La sous-espèce *modesta* est présente en Inde, Asie du sud-est, Indonésie, Malaisie, Japon, Corée, etc., Australie et Nouvelle-Zélande. La sous-espèce *egretta* niche en Amérique, du Canada à l'Argentine. Enfin, la sous-espèce *melanorhynchos* vit en Afrique sub-saharienne et à Madagascar.

Elle hiverne du sud de l'Europe à l'Afrique centrale et du Golfe arabo-persique jusqu'au sud de la Chine et la Corée.

En Europe, où l'effectif nicheur est estimé à environ 25 000 couples, elle est nicheuse principalement en Ukraine (dans les bassins du Dnepr et du Dnestr, surtout au sud, près de la Mer noire), et au sud de la Russie dans les vallées de la Volga et de l'Oural. Elle niche aussi en Hongrie, Autriche et Roumanie, dans la vallée du Danube, et en Azerbaïdjan près de la Mer Caspienne. Elle est plus rare en Serbie et on ne compte que quelques dizaines de couples en Slovaquie, Bulgarie, Moldavie, Grèce, Albanie et Croatie (THEVENOT & BERGIER 2008).

Plus récemment, et surtout depuis les années 1990, l'espèce a progressé vers l'Europe de l'ouest, malgré la réduction des zones humides dans ces pays, et quelques couples nicheurs se sont installés en Biélorussie, en Lettonie et aux Pays-Bas (dès 1977), en Pologne, en Italie (1992) et même en Espagne (1997).

Très rare et menacée au XIX^e siècle et jusqu'au milieu du XX^e siècle, essentiellement à cause de la plumasserie, l'espèce a vu en effet, dès les années 1970, mais surtout dans les années 1980 et 1990, grâce à des mesures de protection légale et les efforts des associations naturalistes, ses effectifs augmenter dans son aire de répartition originelle, à l'instar du Héron cendré. En même temps, elle a entrepris un mouvement d'expansion géographique très notable.

En Europe, l'espèce hiverne principalement en Italie, Macédoine, Dalmatie et Grèce, mais aussi au Moyen-Orient. La population hivernante européenne est de l'ordre de 10 000 individus.

En France, l'espèce était d'apparition accidentelle au XIX^e siècle et jusqu'au milieu du XX^e siècle (MAYAUD 1936), très rare jusque vers les années 1970. Elle hivernait très occasionnellement depuis 1960. Chaque observation devait faire l'objet d'une fiche soumise au Comité d'Homologation National. Mais, depuis 1978, sa présence hivernale est devenue régulière dans les grandes zones humides du pays : Camargue, Dombes, Lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique), Sologne, Brenne (SARDIN 1991). Les effectifs hivernaux se sont accrus très rapidement, d'une dizaine d'oiseaux vers 1980, puis 300 vers 1990 jusqu'à un demi millier vers 1995. La Grande Aigrette a été retirée en 1986 de la liste des oiseaux dont l'observation est soumise à homologation par le CHN.

On compte aujourd'hui environ 3 à 5 000 individus chaque hiver, d'octobre à mars, principalement en Rhône-Alpes (Dombes), Camargue, Lorraine, Lac de Grand-Lieu, Brenne et Sologne, et même jusqu'en Corse (BONACCORSI & FAGGIO 1997).



La première tentative de reproduction en France a eu lieu en 1991 en Camargue (KAYSER, PINEAU, HAFNER & WALMSLEY 1994), mais c'est au Lac de Grand-Lieu, en Loire-Atlantique, qu'un premier couple s'est reproduit avec succès en 1994 (MARION & MARION 1994), puis en Camargue et en Dombes en 1996 (BENMERGUI 1997), en Brenne en 2001, en Brière et marais de l'Erdre (Loire-Atlantique) en 2002 et en Picardie (vallée de Somme) en 2007 (SUEUR 2007). Une vingtaine de couples étaient recensés en 1998, dont une quinzaine à Grand-Lieu (DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO, YESOU 2000).

Ce grand lac reste aujourd'hui le principal site de reproduction français et la seule colonie importante en France avec 29 couples en 2000, 55 en 2003, 69 en 2004, 105 en 2005, 113 en 2006 et 142 en 2007 (DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO, YESOU 2008). Il y avait environ 180 couples nicheurs en 2007 dans notre pays, dont une dizaine en Camargue, ainsi que dans la Somme et en Brière et marais de l'Erdre, un ou deux couples en Dombes ainsi que, irrégulièrement, dans le Nord, la Brenne, etc.

En Rhône-Alpes, la Grande Aigrette est présente en hiver dans tous les départements, mais essentiellement dans l'Ain (Dombes) où l'on compte des groupes de plus de 300 oiseaux sur certains étangs favorables. Elle est notée également tout le long de la vallée du Rhône, ainsi que de celle de la Saône où elle bénéficie de la quiétude nécessaire et de la présence d'îles, gravières ou lônes souvent protégées des dérangements humains. Elle n'est plus soumise à homologation régionale depuis 2004, hors cas avéré de nidification (DELIRY 2010). Elle ne niche que dans l'Ain.

En Dombes, elle est notée pour la première fois en 1976 et y devient régulière en hiver depuis la fin des années 1970, mais plus abondante à partir de 1996. Des parades, puis un accouplement sont observés en 1994, sa présence est notée tout l'été 1995 et, en 1996, la reproduction est confirmée avec l'observation d'un couple avec un juvénile le 24 juin 1996 en bordure d'un étang de la réserve de Villars-les-Dombes. En 1997, deux juvéniles sont également observés avec un couple adulte le 16 juin. Le site de nidification n'a pas été identifié, mais il est probable que ce couple ait niché dans la plus grande colonie d'ardéidés arboricoles qui accueille cinq espèces de hérons (BENMERGUI 1997).

Habitat et reproduction

La Grande Aigrette est surtout inféodée aux grandes zones humides d'eau douce en plaine, mais elle peut nicher jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Ses zones de prédilection sont les marais et étangs, les prairies inondables, les bords des lacs et canaux, les rives des fleuves là où le courant est faible, les

terres agricoles irriguées, les rizières, parfois les marais littoraux à sansouires. On ne la voit qu'exceptionnellement en bord de mer.

Elle se reproduit généralement dans les héronnières, avec les autres espèces d'ardéidés arboricoles (Aigrette garzette, Héron cendré, Héron garde-bœufs, Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*, Crabier chevelu *Ardeola ralloides*) dans des bosquets situés au milieu des marais ou sur des îlots, mais aussi, assez rarement, au sol, dans des roselières, comme le Héron pourpré *Ardea purpurea*.

Pendant la parade nuptiale, le mâle exhibe les 30 à 50 aigrettes filamenteuses de son plumage, qui ont failli valoir à l'espèce son extinction.



Aigrette garzette et Grande Aigrette (D.TISSIER 2010). Noter les pieds jaunes caractéristiques de la garzette

Elle niche sur un large nid de branches, tiges et branchettes entrelacées, construit dans un arbre inaccessible à une hauteur de 5 à 10 mètres, mais parfois sur des arbustes très bas. La femelle pond de 2 à 5 œufs bleu verdâtre clair dès le début du printemps. L'incubation, menée par les deux parents, dure environ 23 à 25 jours. Les poussins sont semi-nidifuges et sont nourris par les deux adultes qui régurgitent les proies directement dans leur bec. Ils commencent à voler à l'âge de 35 à 40 jours.

Migration et passages migratoires en France

Sur les sites de nidification, l'espèce semble plutôt sédentaire et, en tout cas, présente toute l'année. Les premiers migrateurs sont notés dès juillet, mais le passage culmine surtout en octobre et novembre. En France, les oiseaux arrivent surtout d'août à octobre, probablement d'Europe de l'est en majorité, compte-tenu que les effectifs des pays plus nordiques sont très faibles, mais la plupart vont rester hiverner dans les secteurs favorables. Leur halte peut être très courte ou au contraire durer tout l'hiver, selon les conditions météorologiques et l'attrait du site.


En Rhône-Alpes, les oiseaux vont surtout se déplacer en période de gel sur les étangs dombistes, pour rechercher ailleurs leur nourriture. Il ne s'agit plus alors de migration au sens habituel du terme.

La migration pré-nuptiale se déroule en février et mars (LE MARECHAL & MARION 1999). En France, il s'agit plutôt de départs des hivernants qui peuvent se prolonger jusqu'en mai, voire juin.

L'estivage d'oiseaux non nicheurs est fréquemment noté sur toutes les régions d'étangs.

Données du CORA

Il y a 94 données de Grande Aigrette pour 174 oiseaux dans la base de données naturalistes du CORA Faune Sauvage (au 30 avril 2010).



On voit nettement sur le graphe ci-dessus que l'espèce est devenue moins rare à partir de 2006, avec un décalage par rapport aux chiffres nationaux et des effectifs assez faibles, le département n'ayant pas de site vraiment très favorable aux ardéidés. La courbe est certes biaisée par le nombre beaucoup plus élevé d'observateurs rapportant leurs données dans la base depuis 2008, mais la tendance, de même que le sentiment sur le terrain d'une abondance accrue de l'espèce, sont bien nets.

La Grande Aigrette a été notée pour la première fois dans le Rhône par Gérard PIAU le 4 mars 1987 à Montagny, dans les landes que l'on connaît très riches pour l'avifaune et précieuses pour leur biodiversité.

Il a fallu attendre huit ans, plus précisément le 20 janvier 1995, pour que Marcelle LUTRIN observe un second oiseau, dans un champ de Sainte-Consorce, dans l'ouest lyonnais. C'est très probablement le même individu qui fut revu le 28 janvier au bord d'un petit étang de Lentilly (Marcelle & Claude LUTRIN, Dominique TISSIER in TISSIER 2000).


Nous relevons ensuite une donnée de 1996 d'un oiseau qui passe la nuit dans un peuplier le 19 septembre sur l'Ile de la Chèvre à Tupins-et-Semons (CONIB). Ensuite, l'observation de l'espèce devient annuelle. Elle est aujourd'hui devenue assez banale en hiver sur un site comme Miribel-Jonage qui regroupe 36% de toutes les données de la base.

Ces données cumulées ont été classées par décades (périodes de 10 jours) pour obtenir les graphes ci-joints (d'abord celui des données, puis celui du nombre d'individus).

On voit que la très grande majorité des observations sont hivernales, principalement de début décembre à fin février, avec un pic marqué dans la deuxième décennie de janvier avec 20 citations pour 49 oiseaux. La seule donnée de mai concerne deux oiseaux en vol (probablement migratoire) à la Feyssine le 1^{er} mai 2007 (A. VERNIER).

Les oiseaux sont souvent observés solitaires ou par deux, mais quelques données citent cependant plusieurs individus ensemble. L'espèce n'est pas réputée pour être grégaire. On peut penser que ces rassemblements sont dus à l'attrait d'un site (étang riche en proies par exemple) plutôt qu'à une tendance au regroupement volontaire. Ainsi, le 28 décembre 2001, 7 Grandes Aigrettes sont présentes

ensemble dans la roselière nord de Bourdelan d'Anse, (J.P. RULLEAU), 6 oiseaux sont notés à Miribel-Jonage le 15 janvier 2005, puis 5 le 29 au même endroit (O. ROLLET), 6 également sur l'aérodrome de Corbas le 13 octobre 2007 (T. BLANCHON & V. GAGET) lors de la fauche d'un champ. Les deux plus gros groupes sont celui de 12 oiseaux en vol à Echalas le 19 décembre 2009 (E. RIBATTO) et celui de 13 oiseaux en vol à la base Nature de Grigny le 11 janvier 2010, jour de grand froid où 6 individus avaient également été vus au même endroit par le même observateur (V. GAGET). Enfin, 5 oiseaux sont notés à Miribel-Jonage le 17 janvier 2010 (J.M. BELIARD), journée également très froide.




Les communes citées, outre Miribel-Jonage et ses environs, sont Corbas, Feyzin et Solaize, Grigny, Vernaison et Tupins-et-Semons, le long du Rhône, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Laurent-d'Agnay, Saint-Andéol-le-Château et Montagny, Marcy-l'Etoile et Lentilly, Villefranche-sur-Saône, Quincieux, Arnas et Anse dans le Val-de-Saône, Genay et Marennes dans l'est lyonnais, enfin Millery au sud de Lyon.

On voit que ce sont des communes bien prospectées par les ornithologues lyonnais, mais aussi celles qui semblent les plus favorables au passage ou à la halte hivernale de la Grande Aigrette.

L'analyse du graphe montre aussi que, très probablement, ce sont les jours marqués par un froid hivernal marqué, où les étangs de la Dombes sont en partie ou totalement gelés, ainsi en janvier, que le plus grand nombre de Grandes Aigrettes est noté. Les oiseaux en quête de nourriture se déplacent alors vers d'autres sites qui échappent au gel, comme les berges du Rhône ou de la Saône, et le Grand Parc de Miribel-Jonage qui peut également être gelé, mais moins souvent que les plans d'eau peu profonds de l'Ain.

On remarque ce phénomène pour d'autres espèces, comme certains anatidés, en particulier les fuligules, ou, de façon plus anecdotique, ce Pélican frisé *Pelecanus crispus*, vu le 6 février 2010 à Miribel-Jonage (D. & G. TISSIER) et issu du Parc de Villars-les-Dombes ! La majorité de nos Grandes Aigrettes sont donc des oiseaux hivernant en Dombes.



Passages migratoires dans le Rhône

L'analyse des mêmes graphes nous montre que les passages migratoires sont très peu marqués dans notre département. Quelques oiseaux seulement en février et mars, ou en septembre et octobre, sont peut-être de véritables migrateurs de passage. Les quelques groupes observés l'ont été surtout en période hivernale, principalement en décembre et janvier, et ces citations traduisent plutôt un phénomène d'erratisme hivernal lié essentiellement aux conditions météorologiques.

Les Grandes Aigrettes observées dans le Rhône sont donc bien, pour la plupart, des oiseaux hivernants de Rhône-Alpes, et surtout de l'Ain. Signalons également qu'il n'y a aucun indice d'un hivernage complet dans notre département, ni même d'un séjour prolongé en hiver d'un même individu.

Conclusion

L'analyse d'un grand nombre de données collectées par les ornithologues du département a permis une étude assez fine de la phénologie du passage de la Grande Aigrette. Les périodes de séjour ou de simple halte de ce bel oiseau sont ainsi bien connues. Elles correspondent essentiellement à des oiseaux hivernant en Dombes (Ain) et venant, solitaires ou en petit nombre, chercher de la nourriture, surtout en cas de gel sur les étangs dombistes. Autrefois très occasionnelle en France et en Rhône-Alpes, l'espèce y est aujourd'hui plus abondante en hiver ; elle se montre plus souvent dans le Rhône depuis 2006.

Il n'est cependant pas exclu qu'elle puisse, dans les années proches, nicher dans notre département ; si c'était le cas, ce serait probablement dans la seule colonie accueillant plusieurs espèces différentes d'ardéidés (Héron cendré, Aigrette garzette, Héron garde-bœufs, Bihoreau gris), dans une ripisylve du Rhône, en aval de Lyon.

Un grand merci à tous les ornithologues du département qui transmettent leurs notes de terrain. Sans eux, de telles études ne seraient pas possibles !

Dominique TISSIER

Un peu d'étymologie : par un curieux retournement de vocabulaire, si le qualificatif d'aigrette nous fait penser d'abord à une touffe de plumes, l'étymologie nous indique que le mot viendrait du provençal *aigron* qui signifie « héron » ! De même, le mot héron viendrait du francique « *haigro* » (WALTER & AVENAS 2007), donc très probablement de même origine. L'aigrette est donc... un héron, simple construction tautologique !

Les plumes ornementales qui surmontaient les chapeaux des élégantes des *années folles* ont donc pris le nom de l'oiseau, et non pas l'inverse ! Il en est de même pour la huppe !...

Et l'aigrette désigne aussi un ornement de plumes de certains autres oiseaux, comme les hiboux ou les paons.

L'anglais a repris le terme « *egret* » et l'italien « *egretta* », alors que l'allemand « *reiher* » désigne n'importe quel héron. L'espagnol « *garceta* » pour l'aigrette est un diminutif de « *garza* », le héron.

Bibliographie

- **Base de données du CORA.** M.R.E., Lyon, www.cora-faunesauvage.fr
- **BENMERGUI M. (1997).** Premier cas de reproduction de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Dombes (Ain). *Ornithos* 4-4.
- **BERNARD A. & LEBRETON P. (2007).** *Les oiseaux de la Dombes : une mise à jour.* Fondation Pierre Verots et La Revue de l'Académie de la Dombes.
- **BONACCORSI G. & FAGGIO G. (1997).** Hivernage de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Corse. *Alauda* 65.
- **BROWN R., FERGUSON J., LAWRENCE M. & LEES D. (2005).** *Guide des traces et indices d'oiseaux.* Delachaux & Niestlé, Paris.
- **DELIRY C. (2010).** *La Grande Aigrette.* <http://cyrille.deliry.free.fr/chr/wakka.php?wiki=ArdAlb>
- **DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G., YESOU P. (2000).** *Inventaire des oiseaux de France.* Nathan, Paris.
- **DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G., YESOU P. (2008).** *Nouvel inventaire des oiseaux de France.* Delachaux & Niestlé, Paris.
- **DUQUET M. (éd.) (1993).** *La faune de France, inventaire des vertébrés et principaux invertébrés.* Muséum National d'Histoire Naturelle, Eclectis, Paris.
- **KAYSER Y., PINEAU O., HAFNER H. & WALMSLEY J. (1994).** La nidification de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Camargue. *Ornithos* 1-2.
- **LE MARECHAL P. & MARION L. (1999).** Grande Aigrette *Egretta alba* in ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. : *Oiseaux menacés et à surveiller en France.* SEOF / LPO Paris.
- **MAYAUD N. (1936).** *Inventaire des oiseaux de France.* Société d'Etudes Ornithologiques, Paris.
- **MARION L. & MARION P. (1994).** Premières nidifications réussies de la Grande Aigrette *Egretta alba* en France, au lac de Grand-Lieu. *Alauda* 62.
- **MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D. & GRANT P.J. (1999).** *Le guide Ornitho.* Delachaux & Niestlé, Lausanne.
- **RENAUDIER A. (1998).** Les oiseaux du Rhône. *L'Effraie* n°13. CORA-Rhône, Lyon.
- **SARDIN J.-P. (1991).** Grande Aigrette *Egretta alba* in YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. : *Atlas des oiseaux de France en hiver.* Société Ornithologique de France, Paris.
- **SUEUR F. (2007).** Première nidification de la Grande Aigrette *Casmerodius albus* en Picardie. *Ornithos* 14-6.
- **THEVENOT M. & Patrick BERGIER P. (2008).** La Grande Aigrette *Casmerodius albus* au Maroc. *Go-South Bulletin* 5, 30-45.

- TISSIER D. (2000). *Les oiseaux de Marcy l'Etoile* (édité par l'auteur).
- TISSIER D. (2008). Liste des oiseaux du Rhône. *L'Effraie* n°22. CORA-Rhône, Lyon.
- WALTER H. & AVENAS P. (2007). *La mystérieuse histoire du nom des oiseaux*. Laffont, Paris.




Un Pluvier argenté en Val-de-Saône

Jean-Paul RULLEAU

Le jeudi 15 octobre 2009, je faisais une prospection à la gravière de Joux, commune d'Arnas (69), rendue célèbre par la nidification de **Sternes pierregarins** *Sterna hirundo* en 2009 pour la troisième année consécutive. A cette saison, les sternes sont parties, mais la migration nous y réserve quelquefois des surprises...

Approche prudente. Je pose ma longue-vue suffisamment loin pour ne pas provoquer de mouvement de fuite éventuel : je tombe rapidement sur le **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* de service ce jour-là, hochant énergiquement la queue en fouillant du bec les bords vaseux du petit bassin nord. Puis deux petits canards : pas de doute, malgré leur plumage encore terne, il s'agit bien de deux **Sarcelles d'hiver** *Anas crecca* en éclipse.



Je continue à explorer de ma lunette les bords du bassin ainsi que les bancs de sable laissés par un début d'exploitation stoppée ensuite pour cause d'avarie ; un limicole, car il en a bien le comportement, attire soudain mon attention ; sur l'un de ces bancs, il va et vient, picorant au sol quelque nourriture ; sa silhouette un peu ronde, ses pattes relativement courtes, son bec court aussi, tous ces détails m'évoquent irrésistiblement un pluvier, mais lequel ? Il n'est évidemment pas en plumage nuptial...

Il faut que je me rapproche : manœuvre délicate, car je dois contourner la gravière pour être plus près du banc de sable et bénéficier d'un bon éclairage. Je pose ma longue-vue : l'oiseau donne quelques signes d'inquiétude, mais ne s'envole pas ; je peux ainsi mieux le détailler : le dos présente des motifs gris et noir bordés de blanc, le bec me paraît assez fort...

Il pourrait s'agir d'un Pluvier argenté ! Gagner quelques mètres supplémentaires ?...

Zut !... Il s'envole, mais pour se reposer vingt mètres plus loin.

Ne plus le déranger, maintenant, car, au vol, j'ai aperçu le critère distinctif, à savoir les aisselles noires typiques en tout plumage ; c'est donc bien un **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola* !

Le blanc du dessous et les bordures plutôt blanches du dessus plaident pour un adulte internuptial plutôt que pour un juvénile. Son attitude peu farouche, lorsque j'ai outrepassé les limites, semble montrer qu'il avait besoin d'un sérieux repos et de nourriture avant de reprendre la route.

L'espèce est très rare dans le département du Rhône, puisqu'elle migre en suivant plutôt le littoral atlantique. Elle n'est citée que 6 fois dans la base de données du CORA Faune sauvage :

- un oiseau le 24 mai 1980,
- un autre le 12 mai 1981,
- un le 16 novembre 91,
- un en 2002,
- un oiseau (encore en plumage nuptial) du 24 au 28 août 2007 (J.M. BELIARD)
- et, en cette même année 2009, le 20 août (J.M. BELIARD, photo ci-dessous), le même jour que deux Sternes caspiennes *Hydroprogne caspia* !

Tout ceci au Grand Parc de Miribel-Jonage.

Le Pluvier argenté appartient à la famille des Charadriidés, comme son cousin le Pluvier doré *Pluvialis apricaria* et les vanneaux. D'une taille de 27 à 30 centimètres, il fait partie des limicoles de taille plutôt grande, supérieure à celle de la Bécassine des marais *Gallinago gallinago* et de la plupart des chevaliers, sauf le Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* et le Chevalier arlequin *Tringa erythropus* légèrement plus hauts sur pattes. On pourrait le confondre aisément avec le Pluvier doré, quoique celui-ci stationne le plus souvent dans des zones plus sèches, champs, friches à végétation rase, aérodromes, etc... Mais il s'en distingue par sa coloration moins fauve et, en vol, par le noir très visible aux « aisselles » sous les ailes (MULLARNEY, SVENSSON, ZETTERSTRÖM & GRANT 1999).



Il niche dans la toundra du Grand Nord de l'Europe et de l'Amérique, dans l'arctique russe et de l'Alaska à la terre de Baffin. Il migre par la France à partir de début août, quelquefois dès la mi-juillet, avec un pic du passage au milieu du mois de septembre. Un second pic en octobre semble concerner les oiseaux juvéniles et quelques adultes retardataires. Le passage s'effectue sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Il est aussi noté dans le sud de la France.

En hiver, notre pays héberge environ 20 à 30000 oiseaux du Nord à la Charente-Maritime, jusqu'au Teich (Gironde), principalement dans les baies, vasières littorales, estuaires, polders, plans d'eau envasés, etc... Des hivernants sont notés aussi, mais en plus petit nombre, sur le littoral méditerranéen (DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO, YESOU 2008). L'espèce reste très rare à l'intérieur des terres, hormis au passage d'octobre où quelques oiseaux sont annuellement observés dans les grandes régions d'étangs (Champagne, Dombes, etc.).

Dans notre département, il est noté comme migrateur d'apparition accidentelle dans la liste des oiseaux du Rhône (TISSIER 2008).

Notons que, lorsque Gilles CORSAND, ornithologue du même secteur, eut connaissance de mon observation, il me dit qu'il avait observé un individu semblable (photo à l'appui) le 4 de ce même mois d'octobre, soit 11 jours plus tôt ; ce pouvait être le même, mais des doutes subsistent quant à la possibilité pour cet oiseau de rester si longtemps en halte migratoire postnuptiale ? Alors, deux pluviers en Val-de-Saône en moins de 15 jours, ce serait vraiment une première !

Jean-Paul RULLEAU

Devant l'augmentation des observations d'espèces plutôt rares dans le département, ces dernières années, dans cette gravière de Joux, à Arnas, en bordure de Saône, il nous a semblé intéressant d'en rapporter ci-après les données les plus remarquables, que l'on doit à quelques observateurs assidus ayant la bonne idée de transmettre leurs notes !

Quelques observations autour de la gravière de Joux (2004 à 2009)

Situation de la gravière de Joux (commune d'Arnas, Rhône) :

La gravière de Joux est située sur la rive droite de la Saône, à la sortie nord (quartier de l'Ave Maria) de Villefranche-sur-Saône, sur la commune d'Arnas, au lieu-dit « Les Prés de Joux ».

L'exploitation de cette gravière par la société VICAT (Granulats Rhône-Alpes) débuta en 1986, pour une durée de 20 ans sur 75 hectares. Une autorisation d'extension fut accordée en 2005 (malgré l'opposition des APN, FRAPNA et CORA notamment), portant la superficie totale à 170ha, dont 40ha sont en cours de "renaturation", au titre des mesures compensatoires.

1/ La Sterne pierregarin niche ici depuis 2007 (cf. les articles déjà parus dans l'EFFRAIE, TISSIER, GAGET, CORSAND & CHAZAL in l'EFFRAIE n°21, INFO ORNITHO in l'Effraie n°24, INFO ORNITHO in l'Effraie n°27).

Des guifettes ont également été notées : Guifette moustac *Chlidonias hybridus*, sans doute en visite depuis la Dombes où elle est nicheuse ; plus étonnante, cette Guifette noire *Chlidonias niger* observée par Gilles CORSAND, Fred LE GOUIS, et al., et qui a séjourné plusieurs jours en juin 2009.

2/ Le Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : chaque hiver, une concentration importante de Vanneaux huppés se retrouve en remisage dans des champs labourés jouxtant la gravière, souvent en limite d'un pré inondé par les crues hivernales de la Saône. Les comptages *Wetlands* sont inclus, s'il y a lieu, dans le tableau ci-dessous (l'effectif du 17/01/09* est atypique, car, lors du comptage, le gel était à son paroxysme).

Date	Effectif	Date	Effectif
23/01/04	300	30/01/04	300
7/01/05	500	17/02/05	200
28/02/05	120	6/12/05	500
14/01/06	150	24/02/06	400
16/03/06	200	25/03/06	6
12/01/07	80	15/01/08	400
27/11/08	200	9/01/09	200
17/01/09*	35	9/02/09	130
24/02/09	60	5/09/09	1
26/11/09	30		

3/ Autres observations

- ✓ **Le Courlis cendré** *Numenius arquata* est régulier presque toute l'année et même nicheur (un ou deux couples), et pourtant non noté par le bureau chargé de l'étude d'impact!... (dates extrêmes 30/01 et 15/10).
- ✓ D'autres chevaliers : **Chevalier aboyeur**, **Chevalier culblanc** *Tringa ochropus*, **Chevalier gambette** *Tringa totanus*, y font des haltes en migration pré-nuptiale (jusqu'à une dizaine

d'individus lors d'une crue en mars 2006). Le **Chevalier guignette** est visible, comme le Courlis, toute l'année, mais sans preuve de nidification.

- ✓ Le **Petit Gravelot** *Charadrius dubius* est là en période nuptiale et se reproduit sur les gravières.
- ✓ Au passage postnuptial, ont été vus : **Bécasseau variable** *Calidris alpina*, **Bécassine des marais**, **Pluvier argenté**.
- ✓ Les Laridés, **Goéland leucophée** *Larus michahellis* quelquefois et **Mouette rieuse** *Larus ridibundus* constamment, sont en visite depuis la Saône.
- ✓ Le **Héron cendré** *Ardea cinerea* est relativement abondant toute l'année sur le site, alors que quelques passages du **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* et de l'**Aigrette garzette** *Egretta garzetta* ont été notés. Une **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* a été vue en janvier 2009 dans la prairie humide en compagnie des courlis et vanneaux. Une **Grande Aigrette** *Casmerodius alba* stationnait sur la lône le 14 janvier 2010.
- ✓ Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* immature est observé (J.P. RULLEAU) dans la lône de la gravière de Joux le 5 septembre 2009.
- ✓ Des épisodes de crues importantes (mars-avril 2006) permettent de voir dans les prés inondés, entre la Saône et les embouchures du Marverand et du Nizerand, des anatidés inhabituels tels que **Canard souchet** *Anas clypeata*, **Sarcelle d'été** *Anas querquedula*, **Fuligule morillon** *Aythya ferina*, alors que la **Sarcelle d'hiver** n'est pas rare à l'automne et à l'hiver (plus de 70 oiseaux le 14 janvier 2010).
- ✓ Quant aux passereaux, la **Bergeronnette grise** *Motacilla alba* et la **Bergeronnette printanière** *M. flava* nichent sur le site ; les **Hirondelles rustiques** *Hirundo rustica* et les **Hirondelles de fenêtre** *Delichon urbica* chassent en groupes sur les plans d'eau ; le **Rosignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* chante dans les ripisylves du Marverand.

4/ Quelques autres observations communiquées "en vrac" par G. CORSAND (comm. pers.) qui a aussi largement contribué au suivi de la nidification de la Sterne pierregarin sur le site :

- 1 Cigogne blanche, 3 Grues cendrées *Grus grus*
- Canard pilet *Anas acuta*, Canard chipeau *Anas strepera*, Canard siffleur *Anas penelope*
- 2 Guifettes noires *Chlidonias niger*
- Faucon hobereau *Falco subbuteo*, 1 Faucon pèlerin *Falco peregrinus*, 1 Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*
- Barge rousse *Limosa lapponica*, Chevalier aboyeur, Bécasseau variable
- Hirondelle de rivage *Riparia riparia*
- Huppe fasciée *Upupa epops*, Guêpier d'Europe *Merops apiaster*, Pic noir *Dryocopos martius*
- Bruant proyer *Miliaria calandra*, Tarier des prés *Saxicola rubetra*, Rémiz penduline *Remiz pendulinus*, Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Et puis ces observations exceptionnelles correspondant à une période prolongée de crue printanière inondant les prairies de Joux entre le 4/04/2005 et le 21/05/2005 :

- 3 Echasses blanches *Himantopus himantopus*, Petit Gravelot, 13 Grands Gravelots *Charadrius hiaticula*, Vanneau huppé, 1 Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*, Bécassine des marais, 6 Courlis corlieus *Numenius phaeopus*, Chevalier arlequin, Chevalier gambette, 22 Chevaliers aboyeurs, 10 Chevaliers culblancs, 6 Chevaliers sylvains *Tringa glareola*...

A noter également que le 21 juin 2009, Fred LE GOUIS observait sur ce site deux **Oedicnèmes criards** *Burhinus oedicnemus* sur un terrain mis à nu par les engins de chantier et descendant en pente douce vers la gravière en eau (INFO ORNITHO in l'Effraie n°27). A cette date, il est très probable qu'il

s'agissait d'un couple, même s'il n'y a pas eu de preuve de nidification. C'est la première donnée départementale, pour cette espèce, de reproduction possible en gravière en bord de fleuve, d'autres cas ayant été constatés sur des gravières ou carrières de l'est lyonnais, mais en zone de cultures céréalières.

Alors, si beaucoup d'ornithologues vont pratiquer leur passion à Miribel-Jonage ou au Grand Large, ce site de Joux, en Val-de-Saône, bien moins prospecté, mérite bien qu'on y fasse aussi un détour !

J.P. RULLEAU (janvier 2010)

Bibliographie

- **CORA Faune Sauvage (2009)**. Base de données. M.R.E., Lyon, www.corafaunesauvage.fr.
- **CORA-Rhône**. Les chroniques départementales publiées dans les circulaires mensuelles et dans l'Effraie. CORA-Rhône, Lyon.
- **DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G., YESOU P. (2008)**. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris.
- **INFO ORNITHO (2008)** in l'Effraie n°24, CORA-Rhône.
- **INFO ORNITHO (2009)** in l'Effraie n°27, CORA-Rhône.
- **MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D. & GRANT P.J. (1999)**. *Le guide Ornitho*. Delachaux & Niestlé, Lausanne.
- **TISSIER, GAGET, CORSAND & CHAZAL (2007)**. Première reproduction de la Sterne pierregarin dans le Rhône. L'EFFRAIE n°21, CORA-Rhône.
- **TISSIER D. (2008)**. Liste des oiseaux du Rhône. L'Effraie n°22. CORA-Rhône, Lyon.

Le dessin du Pluvier argenté est réalisé d'après un original de S. NICOLLE in DUQUET M. (éd.) (1993). La Faune de France. Inventaire des Vertébrés et principaux Invertébrés. ECLECTIS. MNHN, Paris.

Le CORA à la découverte du littoral : Manche et Mer d'Iroise

Pour rendre la lecture plus aisée, les noms scientifiques ont été renvoyés dans les listes mises en annexe.

Jean-Paul RULLEAU (novembre 2009)

I. LA MANCHE (26/09 au 2/10/2009)

La baie du Mont-Saint-Michel, à la limite de la Bretagne et de la Normandie, est une immense étendue sableuse ou vaseuse recouverte à marée haute, à l'exception de deux îlots, ceux du Mont-Saint-Michel et de Tombelaine ; les vasières et les prés salés (appelés "herbus") qui les bordent accueillent des millions d'oiseaux migrateurs et hivernants (anatidés et limicoles essentiellement).

Samedi 26 septembre 2009 : de Lyon à Rennes (TGV), puis de Rennes à Lingreville (voitures)

Le groupe s'installe dans l'ancien presbytère du village, magnifique bâtiment en pierre de taille, commandant une cour dont le noyer nous fournira ses fruits, et un grand terrain dont l'herbe verte donne une idée du climat normand.

Après prise de possession des chambres, direction le Havre de Vanlée pour un premier contact avec la grève et les dunes de la Manche. Le coucher du soleil nous donne de somptueux éclairages qui ne nous empêchent pas d'observer sur la grève : **Goélands argentés** et **marins**, **Mouettes rieuses**, **Huîtriers pies**, **Courlis cendrés**, **Bécasseaux variables**, **Grands Gravelots**, **Aigrettes garzettes** et **Traquets motteux** sur la laisse de mer. Des Asters maritimes terminent leur saison de floraison.

Dimanche 27 septembre : traversée de la Baie du Mont Saint-Michel à pied

Hélas, la brume est épaisse et ne laisse rien deviner du Mont... mais accentue cette impression d'immensité infinie forcément ressentie.

Dans une vasière, quelques **Tadornes de Belon** fouillent le limon, un **Courlis cendré** se fait entendre, se fait voir, se pose enfin...



Peu à peu, l'îlot de Tombelaine d'abord, puis le Mont lui-même émergent de la brume. Dans les rochers de Tombelaine, des **Accenteurs mouchets** deviennent visibles. Une **Barge à queue noire** en ombre chinoise se découpe dans la brume. Nous traversons le Couesnon, la Sée et la Sélune, avec de l'eau tout au plus au genou. Pour amuser le touriste, notre guide nous fait tâter du pied les fameux sables mouvants : effet de ventouse aspirante garanti !

Visite rapide de la cité, (où un bel If offre, à portée de mains, ses arilles rouge vif à

l'enveloppe externe comestible, mais à la graine mortellement toxique), mais malheureusement le temps manque pour pénétrer dans l'abbaye...

Les falaises de Carolles (la cabane Vauban)

Un chemin mène aux falaises à travers bois et landes. Une végétation surprenante y règne : Scolopendres, Fragon petit-houx, Balsamine de l'Himalaya, Cyclamens, Iris fétide. La vue s'étend vers le Mont Saint-Michel et Granville.

La migration semble au point mort, en raison sans doute du vent violent...

Lundi 28 septembre : Saint-Michel-des-Loups, plage de Dragey, Pointe du Grouin du sud

D'abord, le bocage normand, dans la brume matinale, comme il se doit. **Rougegorges familiers**, **Sittelles torchepots**, **Grimpereaux des jardins**, **Mésanges bleues** et à **longue queue**, **Pouillots véloce**, **Pigeons ramiers**, **Troglodytes mignons**, **Geais des chênes**, **Grives draines** et **musiciennes**, **Pic épeiche**, **Pies bavardes**, **Merles noirs**, **Pinsons des arbres**, **Etourneaux sansonnets**, **Bergeronnettes grises**, voilà qui nous rappelle nos campagnes !

A la plage de Dragey, la mer est loin, malgré la marée montante, et la grève s'étend à perte de vue. Des milliers de **Mouettes rieuses** nous assourdissent de leurs cris. **Grande Aigrette** et **Aigrette garzette** se côtoient pour permettre des comparaisons. Une vingtaine de **Macreuses noires** se laissent entrevoir, à quelque distance ; d'un autre point d'observation plus favorable, nous estimerons leur effectif à près d'une centaine, plongeant, s'ébrouant, s'envolant juste devant la plage !

A la Pointe du Grouin, des **Courlis cendrés** farfouillent dans la vase de la Sélune ; des **Tadornes de Belon** passent en vol.

Mardi 29 septembre : plage et dunes du Havre de Gefosses, Lessay, Pointe d'Agon

Gefosses... Bruit de fond : **Goélands**, **Huîtriers pies**, **Courlis cendrés**, **Grands Cormorans**, **Barge rousse**, **Pluvier argenté**, **Canard chipeau**, le tout très loin de nous. Au premier plan, des **Linottes mélodieuses** en troupe dans les buissons. Dans le chemin, un cadavre de **Vipère péliade** (juvénile) nous arrête un moment, ainsi qu'une grosse chenille de **Minime à bandes jaunes**. La flore dunaire est encore présente : Lyciet de Barbarie, Liseron des sables, Chardon bleu, Euphorbe.

Lessay (dunes de Créances) : nous pique-niquons dans les dunes sous l'œil très intéressé d'un **Traquet motteux**. Des **Hirondelles rustiques** en migration nous survolent. Des vols de **Pipits farlouses** envahissent les champs de carottes et poireaux cultivés dans l'arrière-dune.

Pointe d'Agon : au loin, un millier d'**Huîtriers pies** stationnent sur les bords de l'estuaire, des **Sternes caugek** volent, pêchent ou se posent sur les bancs de sable.

Côté mer, un îlot de sable résiste à la marée montante et toute une foule s'y est réfugiée : 25 **Eiders à duvet**, en différents plumages, 3 **Bernaches cravants** (nos premières !), **Barges sp.**, **Courlis cendrés** et **Bécasseaux sanderling**, par centaines, bien rangés par espèces ! Avec le flux montant, de somptueux envols tournoyants et étincelants miroitent dans la lumière du couchant...

Mercredi 30 septembre : expédition aux îles Chausey

Les îles Chausey, au large de Granville sont un archipel de 65ha dont 45 pour la Grande Ile que nous avons visitée. Pour le reste, les dépliants touristiques parlent de 360 îlots ! Les îles Chausey deviennent une carrière de granit dès le Moyen-âge, fournissant notamment les pierres ayant servi à la construction de la "Merveille de l'Occident", l'abbaye du Mont Saint-Michel.

Départ du port de Granville dans la brume, une habitude maintenant. La mer semble recouverte de rochers, de récifs, de cailloux... entre lesquels nous apercevons 5 **Guillemots de Troïl** posés sur l'eau ; des **Fous de Bassan** vont et viennent, plongeant dans des piqués ébouriffants.

Le tour de l'île est vite fait, mais permet quelques observations : **Huîtriers pies** en vol, **Pipits farlouses** et **maritimes** (nous percevons bien les différences de coloration des pattes), encore des **Hirondelles rustiques**, un **Tarier pâtre** mâle, des **Accenteurs mouchets**, une jeune **Perdrix grise** qui nous donne une belle leçon de camouflage et de sang-froid devant un chien divaguant, 3 **Barges rousses** et surtout, à la limite optique de nos instruments, parmi les îlots, 5 **Harles huppés** (2 mâles en éclipse et 3 femelles ou juvéniles) qui donnent lieu à d'âpres discussions d'homologation dans le groupe ! Les buissons regorgent d'**Epeires diadèmes** femelles de belle taille, à l'affût sur leur toile. Nous pique-niquons sur une plage en compagnie d'un **Goéland sp.** immature effronté et, nous semble-t-il, handicapé d'une aile.

Au retour, des **Sternes caugek** volent ou sont posées sur un rocher ; une centaine de **Fous de Bassan** passe en formant un cordon très étiré ; d'autres **Guillemots de Troïl** sont visibles de part et d'autre du bateau.

Jeudi 1er octobre : Gorges, Auvers, Utah Beach, Beauguillot

Tourbière et prés humides autour de la chapelle Sainte-Anne (Gorges) : vol de **Vanneaux huppés** au loin, **Busard Saint-Martin** femelle, envol de 8 **Courlis cendrés**, **Tariers des prés** et **Tariers pâtres**, **Chardonnerets élégants**...

Auvers (Marais du Rivage) : **Busard Saint-Martin**, un vol de plusieurs centaines de **Grands Cormorans**, des centaines de **Mouettes rieuses** tournent autour d'un plan d'eau éloigné, une cinquantaine de **Chardonnerets élégants** passe en vol groupé.

Court arrêt à Utah Beach où l'émotion nous saisit à la pensée de toutes ces jeunes vies sacrifiées à la cause de la Liberté...

Réserve Naturelle de Beauguillot : au moins 4 **Busards Saint-Martin** (dont un beau mâle gris) maraudent lentement au ras des prés humides ; dans une prairie, une dizaine d'**Oies cendrées** voisine avec une centaine de **Vanneaux huppés** ; au bord d'une vasière, un **Ragondin** se toilette longuement, pendant que ses rejetons explorent les environs. 3 **Bécassines des marais**, quelques **Canards colverts** et **Sarcelles d'hiver** en éclipse font la sieste dans la végétation ou au bord de l'eau. Sur un petit plan d'eau, au moins 15 **Grèbes castagneux** font leur numéro, plongeant dès que nous essayons de les regarder.

Depuis les dunes, nous observons, à très longue distance hélas, une douzaine de **Veaux marins** se prélassant sur un banc de sable. Plus loin, 20 **Bernaches cravants** d'un côté, 50 **Canards siffleurs** de l'autre ! Deux vols, 50, puis 10, confirment que les Bernaches sont bien arrivées !

Vendredi 2 octobre : Les Salines, Havre de la Vanlée, Pointe d'Agon

Sur les prés salés, de nombreux ovins broutent. Un **Chevalier aboyeur** se laisse observer sur une vasière. **Cormorans** et **Courlis cendrés** passent en vol.

Sur les bouchots à moules, une nuée de **Goélands**, 3 **Barges sp.**, un **Tadorne de Belon** arpentent le rivage. Soudain, c'est l'excitation : un **Balbuzard pêcheur**, sans doute juvénile (présence de taches claires sur l'aile), posé au bord de l'eau, dévore une proie ; dérangé par une **Corneille noire**, il va se percher sur un grand pieu planté dans l'eau, puis sur un autre, et change encore et encore de perchoir, toujours en rupture d'équilibre... il s'envole enfin. Plus tard, il repassera au-dessus des dunes, bien plus haut dans les airs.

A la Pointe d'Agon, vols de **Courlis cendrés** (30 à 40). La marée montante amène des vagues successives d'**Huîtriers pies**, par centaines à la fois, et de **Courlis cendrés**. 25 à 30 **Bernaches cravants** se posent sur l'eau dans des gerbes d'écume ; les laridés (**Goélands argentés**, **Goélands marins**, **Mouettes rieuses**) se côtoient, se mélangent, puis s'envolent pour tournoyer sur l'eau. 3 **Sterne caugek** pêchent. Les Bernaches s'isolent de la masse. Pas mal, non ? Pour mettre un point final à notre séjour en Manche, séjour agrémenté gastronomiquement grâce à la conjugaison de toutes les compétences, sans omettre la bonne humeur générale distillée par notre capitaine de route, Michel KERDRAON.

Jean-Paul RULLEAU (novembre 2009)

Flore observée

Aster maritime *Aster tripolium*
If commun *Taxus baccata*
Scolopendre *Phyllitis scolopendrium*
Fragon petit-houx *Ruscus aculeatus*
Balsamine de l'Himalaya *Impatiens glandulifera*

Cyclamen Cyclamen hederifolium
Iris fétide Iris foetidissima
Lyciet de Barbarie *Lycium barbarum*
Liseron des sables *Calystegia soldanella*
Chardon bleu *Eryngium maritimum*
Euphorbe des dunes *Euphorbia paralias*

Faune diverse

Ragondin *Myocastor coypus*
Phoque Veau marin *Phoca vitulina*

Vipère péliade (cadavre) *Vipera berus*
Minime à bandes jaunes (chenille) *Lasiocampa quercus*
Epeire diadème *Araneus diadematus*

Avifaune observée

(liste non exhaustive : pardon aux Moineaux domestiques et autres Corneilles noires, non cités)

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*
Fou de Bassan *Sula bassana*
Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*
Aigrette garzette *Egretta garzetta*
Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*
Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Grande Aigrette *Casmerodius albus*
Héron cendré *Ardea cinerea*
Oie cendrée *Anser anser*
Bernache cravant *Branta bernicla*
Sarcelle d'hiver *Anas crecca*
Canard siffleur *Anas penelope*

Canard chipeau *Anas strepera*
 Eider à duvet *Somateria mollissima*
 Macreuse noire *Melanitta nigra*
 Harle huppé *Mergus serrator*
 Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*
 Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*
 Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*
 Perdrix grise *Perdix perdix*
 Hûtrier pie *Haematopus ostralegus*
 Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*
 Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*
 Vanneau huppé *Vanellus vanellus*
 Bécasseau sanderling *Calidris alba*
 Bécasseau variable *Calidris alpina*
 Courlis cendré *Numenius arquata*
 Barge à queue noire *Limosa limosa*
 Barge rousse *Limosa lapponica*
 Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
 Goéland argenté *Larus argentatus*
 Goéland marin *Larus marinus*
 Mouette rieuse *Larus ridibundus*
 Sterne caugek *Sterna sandvicensis*
 Guillemot de Troil *Uria aalge*
 Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
 Pipit farlouse *Anthus pratensis*
 Pipit maritime *Anthus petrosus*
 Accenteur mouchet *Prunella modularis*
 Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*
 Rougegorge familier *Erithacus rubecula*
 Tarier pâtre *Saxicola torquata*
 Tarier des prés *Saxicola rubetra*
 Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*
 Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
 Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*



Le CORA à la découverte du littoral : Manche et Mer d'Iroise

Pour rendre la lecture plus aisée, les noms scientifiques ont été renvoyés dans les listes mises en annexe.

Jean-Paul RULLEAU (novembre 2009)

II. OUESSANT (3/10 au 11/10/2009)

L'île d'Ouessant est la terre la plus à l'ouest du territoire français métropolitain ; elle se compose d'un plateau d'environ 8km sur 3, qui s'abaisse d'est en ouest, bordé de falaises découpées et entouré de centaines d'îlots et d'écueils. L'île doit sa notoriété auprès des ornithologues aux nombreux passages et arrêts migratoires d'automne qui y amènent fréquemment de grands voyageurs nordiques, sibériens ou même nord-américains. Elle fait désormais partie, comme les îles de Molène et de Sein, du tout nouveau Parc naturel marin d'Iroise.

Samedi 3 octobre 2009 : de Lingreville à Brest

De Lingreville, une dizaine de survivants du séjour en Manche fait le transfert jusqu'à Brest où 7 autres rhodaniens arrivent directement de Lyon. Michel passe le relais à Martine pour prendre les commandes.



Dimanche 4 octobre : traversée vers Ouessant

Mer d'huile, sous un ciel serein. L'*Eunez Eussa III* nous amène tranquillement à bon port. Seuls quelques **Fous de Bassan** nous tiennent compagnie. Au Stiff, après avoir enfourché nos montures de location, nous pédalons jusqu'au CEMO, notre gîte habituel, où nous prenons possession de nos quartiers sans lutte intestine pour la répartition des chambres et couchettes !

Première destination, la plage de Korz : la marée est favorable, et sur la plage, nous observons les **Goélands marins** et **argentés** et les **Mouettes rieuses**, ainsi que, entre rochers et laisses de mer, les limicoles "classiques" qui s'activent, une dizaine de **Grands Gravelots**, un **Bécasseau variable**, 6 **Tournepierres à collier** et 1 **Huîtrier pie**.

Porz Coret : quelques **Canards colverts**, toujours un peu surprenants pour les néophytes à Ouessant, un premier **Cormoran huppé**, deux **Craves à bec rouge**, dont Ouessant abrite une petite population, se font entendre sur la lande derrière nous.

Porz Douan : dans les cailloux recouverts de laisse de mer, grouillent les **Pipits maritimes** et **farlouses**, les **Tournepierres à collier** et un **Bécasseau sanderling** bien esseulé. Des **Traquets motteux** hésitent entre le bord de falaise et les premiers rochers. Deux **Craves** passent sur la lande. **Grands Cormorans**, **Cormorans huppés** et **Huîtriers pies** (une bonne quarantaine) se partagent les rochers. Au large, les **Fous de Bassan** croisent et plongent à pic ; encore plus loin, ce sont des **Puffins des Anglais** qui rasent l'eau à grande vitesse. Pour un premier après-midi, notre échantillonnage de l'avifaune ouessantine ne se présente pas trop mal !

Au passage, des yeux de botaniste auront également pu remarquer la *Criste marine* ou perce-pierre qui pousse dans les rochers du bord de mer, ainsi que l'*Armérie maritime*, l'*Inule faux-crithmum* et la *Spergulaire marine* sur les pelouses ou dans les fissures de rochers.

Lundi 5 octobre

Il a plu abondamment la nuit et en début de matinée. Le brouillard nous dissimule le phare du Creac'h, à 300m de là, et la corne de brume retentit sur le rail d'Ouessant. La météo évolue ensuite rapidement vers un soleil radieux qui nous incite à sortir de notre tanière.

Pointe de Pern : sur la lande, **Tariers pâtres** et **des prés**, **Chardonnerets élégants** et **Alouettes lulu**, **Craves à bec rouge** ; un **Busard des roseaux** passe, en maraude, dans les rochers, **Goélands marins** et **argentés**, **Pipits maritimes** et **farlouses**, **Traquets motteux** et **Rougegorges familiers**. Sur la mer, filent toujours les **Fous de Bassan**.

Le *Silène maritime* épanouit encore ses fleurs blanches ; dans chaque crevasse arrosée par les embruns, se tapit la fougère des falaises, la *Doradille marine*. Sur le chemin, un inoffensif coléoptère noir retroussé pourtant son abdomen, façon scorpion, d'un air menaçant : c'est le **Staphylin**.

L'après-midi, la brume revient, avant de se transformer en pluie. Une courte incursion vers les falaises faisant face à l'île Keller, au nord de l'île, nous fait rencontrer une famille de **Tariers pâtres** ; à proximité du CEMO, voulant photographier une vieille source dans une zone humide, je fais lever 3 **Bécassines des marais**.



Mardi 6 octobre

Du CEMO vers le phare du Creac'h, puis le long de la côte nord-ouest vers la Pointe de Pern : brume et crachin seront notre lot... de départ.

3 **Bécassines des marais** (celles d'hier ?), un **Courlis cendré**, les **Huîtriers pies** et **Tournepierres à collier** familiers, **Goélands marins** et **argentés**, **Cormorans** des deux espèces, une **Aigrette garzette**, un vol d'une quinzaine de **Craves à bec rouge**, un couple de **Faucons crécerelles**, **Tariers pâtres**, **Traquets motteux**,

Rougegorges, **Chardonnerets élégants**, des **Bergeronnettes des ruisseaux** de 1^{er} hiver sur les galets, **Fous de Bassan** au large. Une pluie torrentielle nous empêche d'enrichir notre collection et nous ramène au CEMO trempés comme des soupes !

L'après-midi, nouvelle incursion vers l'île Keller pour observer la colonie de **Goélands marins** qui y a élu domicile, ainsi que le reposoir à **Huîtriers pies**. Un **Busard des roseaux** plane sur la lande. Un petit groupe aperçoit le premier **Phoque gris**.

Mercredi 7 octobre

Ce matin, il pleut, puis une éclaircie se dessine. Vite, à trois, une petite échappée vers le sud-est de l'île... Arrêt au port de Lampaul, le village "capitale", où une cinquantaine de **Tournepierres à collier** profite de la marée descendante pour faire une razzia dans les algues.

A Port Arland, la falaise surplombant la plage est habitée par de nombreux **Lapins de garenne** : vue sur la mer garantie ! **Huîtriers pies**, **Cormorans huppés** et **Goélands marins** sont les seuls êtres ailés du secteur.

Retour par Merdy (sic), le réservoir d'eau potable de l'île : à part une **Grive musicienne**, complaisamment posée sur un fil électrique, là aussi, c'est le désert ! Au moulin de Kun, un **Courlis cendré** s'envole en

chantant. La zone humide abrite toujours quelques plantes intéressantes : la *Potentille des oies*, l'*Ecuelle d'eau* ou *Hydrocotyle*, la *Baldellie fausse-renoncule*...

L'après-midi, le temps clémente se maintient et nous permet de suivre la côte, du CEMO vers le phare du Nividic, via le Creac'h, puis vers la Pointe de Pern. Ce sera l'après-midi "rapaces" : en plus des observations quotidiennes déjà notées, nous allons voir un **Faucon crécerelle**, un **Epervier d'Europe** et surtout deux **Faucons pèlerins** posés sur l'îlot rocheux de Youc'h Korz ! Malgré la distance, les longues-vues permettent de bien voir le masque moustachu caractéristique de l'espèce.

Jeudi 8 octobre

Temps gris et froid. Ce matin, je pars seul. Au moulin de Kun, une **Bécassine des marais** s'envole, un **Busard des roseaux** femelle chasse au ras du sol.

A la plage de Korz, j'observe deux **Courlis cendrés**, dont l'un me semble être doté d'un bec démesuré : sans doute s'agit-il ici du dimorphisme sexuel entre la femelle au bec long et le mâle (surtout juvénile) au bec plus court. Ce bec formidable permet à l'oiseau d'extirper hors de son trou un ver de sable non moins démesuré ! J'en accorde moins d'intérêt aux **Grands Gravelots** et **Tournepierres** habituels sur cette plage.

A Porz Coret, je retrouve 2 **Courlis** et des **Huîtriers pies**. A Porz Doun, encore un **Courlis** ! Une vingtaine de **Colverts**, toujours aussi insolites, 2 **Hirondelles rustiques** en migration, des **Traquets motteux**, en veux-tu en voilà sur le chemin côtier. Et puis, le lot quotidien : pipits, goélands, cormorans, fous, craves.

L'après-midi, même circuit, avec le groupe. A Korz, si les **Tournepierres** sont bien toujours là, la surprise vient du ciel : un **Faucon hobereau**, revêtu de ses culottes rouges, vient semer la panique dans les rangs de nos sympathiques limicoles, sans autre résultat tangible qu'un envol désordonné de la petite troupe.

A Porz Doun, les **Traquets** sont aussi nombreux que le matin, moins nombreux cependant que les **Fous de Bassan** qui passent à proximité du phare de la Jument ; parmi eux, des "black sheep", à savoir des **Puffins des Anglais** au ras de l'eau. Trois douzaines d'**Huîtriers pies** se posent, s'envolent, changent de rochers... l'un d'entre eux se toilette longuement, plongeant la tête dans l'eau, s'ébrouant, lissant ses plumes. Soudain, Eric me désigne un "tournepierrière" qui, dit-il, vient de se poser sur un rocher éloigné : je lui trouve un air bizarre que la longue-vue m'explique, il s'agit en réalité d'un **Chevalier gambette** aux pattes et au bec rouges... rien de bien rare, me direz-vous ? Non, mais c'est le premier de notre séjour !

Dans la lande, *Ajonc de Le Gall* (petit ajonc endémique des falaises côtières) et *Bruyère cendrée* fleurissent encore un peu. Au retour, Martine fait un comptage de lapins : 19 !.. dans un seul pré, face à une maisonnette.

Vendredi 9 octobre

Le crachin du CEMO se transforme en soleil à l'autre extrémité de l'île. Au Stiff, sur la presqu'île de Cadoran, les panaches blancs des lapins disparaissent dans les rochers ; **Troglodytes mignons** et **Mésanges charbonnières** sont notés dans la lande, en compagnie de deux magnifiques boucs à l'attache, à l'écart du troupeau de chèvres demi-sauvages que nous ne verrons que le lendemain. Nous observons le *Genêt maritime* que les éléments obligent à pousser sous forme prostrée au sol. Des centaines de **Fous de Bassan** tournoient au loin dans le sillage de trois bateaux de pêche.

Après-midi grise à nouveau, de Yusin à Keller. Un **Busard des roseaux** plane sur la lande ; deux **Courlis cendrés**, puis un qui ne l'est pas (cendré) : sa raie au milieu et son bec court trahissent le **Courlis corlieu** ; les **Huîtriers pies** se rassemblent par dizaines sur leur rocher, entre Ouessant et Keller, un **Chevalier guignette** vient enrichir notre collection... Michel se cache pour aller photographier égoïstement un **Gobemouche gris**, à défaut du nain du même nom !..

Samedi 10 octobre

Il fait beau dès le matin ! La marée haute a fait refluer les **Courlis cendrés** de Porz Coret sur les rochers, en compagnie de plusieurs dizaines d'**Huîtriers pies**.

A Porz Doun, rien de neuf, sinon les **Tournepierres** qui semblent ne savoir où donner de la tête tant les puces de mer sont abondantes ; le **Chevalier gambette** d'hier s'est dédoublé : ils sont aujourd'hui deux à picorer de conserve ; tout le monde, pipits, traquets, mouettes, goélands, aigrette, gravelots, est à la fête. Ah !... un intrus, repéré grâce à ses pattes jaunes : un **Goéland leucophée**, bien seul au milieu des argentés.

Retour sur Porz Coret pour l'ultime pique-nique (enfin un vrai, au soleil, sur la plage !); un petit grèbe nous occupe un moment : castagneux ou pas castagneux ? La distance ne nous permet pas de trancher...

A Penn Arlan, nous allons voir le cromlech et rencontrons le troupeau de chèvres. Enfin, un **Goéland brun** se détache de tous les Goélands marins.

Le Stiff : il faut rendre les vélos, rembarquer sur l'Eunez Eussa III... Selon un jeune ornithologue qui fait le trajet avec nous, les **Puffins** que nous voyons passer au loin sont de trois espèces : **des Anglais**, **des Baléares** et **fuligineux**. Nous acceptons ses conclusions avec déférence ou méfiance, selon nos tempéraments. Nous n'aurons pas vu non plus le **Gobemouche nain**, ni le **Pipit de la Petchora**...

A l'arrivée à Brest, le bateau est accompagné par un mammifère marin que personne n'est capable d'identifier avec certitude : dauphin ou marsouin ? Il faut accepter nos limites, ce qui ne nous empêche pas de partir d'Ouessant avec la certitude d'avoir fait un beau séjour, sous une météo qui nous valut des humeurs célestes... et humaines très variables !

Jean-Paul RULLEAU (novembre 2009)

	OISEAUX OBSERVES	FLORE CARACTERISTIQUE
1	Accenteur mouchet <i>Prunella modularis</i>	Ajonc de Le Gall <i>Ulex gallii</i>
2	Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i>	Ajonc d'Europe <i>Ulex europaeus</i>
3	Alouette lulu <i>Lullula arborea</i>	Armérie maritime <i>Armeria maritima</i>
4	Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>	Baldellie fausse-renoncule <i>Baldellia ranunculoides</i>
5	Bécasseau variable <i>Calidris alpina</i>	Bruyère cendrée <i>Erica cinerea</i>
6	Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i>	Criste marine <i>Crithmum maritimum</i>
7	Bergeronnette des ruisseaux <i>Motacilla cinerea</i>	Doradille marine <i>Asplenium marinum</i>
8	Bergeronnette grise <i>Motacilla alba</i>	Genêt maritime <i>Cytisus scoparius ssp maritimus</i>
9	Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>	Inule crithmoïde <i>Inula crithmoides</i>
10	Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>	Potentille des oies <i>Potentilla anserina</i>
11	Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i>	Silène maritime <i>Silene uniflora</i>
12	Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	Spergulaire marine <i>Spergularia marina</i>
13	Chevalier gambette <i>Tringa totanus</i>	
14	Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i>	FAUNE DIVERSE
15	Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	
16	Corneille noire <i>Corvus corone</i>	Lapin de garenne <i>Oryctolagus cuniculus</i>
17	Courlis cendré <i>Numenius arquata</i>	Phoque gris <i>Halychoerus grypus</i>
18	Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus</i>	
19	Crave à bec rouge <i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	Staphylin <i>Staphylinus olens</i>
20	Epervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i>	
21	Etourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i>	

22	Faisan de Colchide <i>Phasianidés colchicus</i>	
23	Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	
24	Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>	
25	Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i>	
26	Fou de Bassan <i>Sula bassana</i>	
27	Foulque macroule <i>Fulica atra</i>	
28	Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i>	
29	Goéland argenté <i>Larus argentatus</i>	
30	Goéland brun <i>Larus fuscus</i>	
31	Goéland leucophée ? <i>Larus michahellis</i>	
32	Goéland marin <i>Larus marinus</i>	
33	Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	
34	Grand Gravelot <i>Charadrius hiaticula</i>	
35	Grèbe castagneux ou à cou noir	
36	Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>	
37	Héron cendré <i>Ardea cinerea</i>	
38	Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>	
39	Huîtrier pie <i>Haematopus ostralegus</i>	
40	Linotte mélodieuse <i>Carduelis cannabina</i>	
41	Merle noir <i>Turdus merula</i>	
42	Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	
43	Moineau domestique <i>Passer domesticus</i>	
44	Mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>	
45	Pigeon biset domestique <i>Columba livia</i>	
46	Pigeon ramier <i>Columba palumbus</i>	
47	Pipit farlouse <i>Anthus pratensis</i>	
48	Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i>	
49	Plongeon (non identifié)	
50	Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	
51	Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	
52	Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i>	
53	Puffin des Baléares (vu par ornitho sur bateau)	
54	Puffin fuligineux (vu par ornitho sur bateau)	
55	Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	
56	Tarier des près <i>Saxicola rubetra</i>	
57	Tarier pâtre <i>Saxicola torquata</i>	
58	Tarin des aulnes <i>Carduelis spinus</i>	
59	Tournepierre à collier <i>Arenaria interpres</i>	
60	Tourterelle turque <i>Streptopelia decaocto</i>	
61	Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i>	
62	Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i>	

Le rassemblement d'Oedicnèmes criards de Saint-Priest en 2009

Cyrille FREY

Le site du « Capot », au lieu-dit Manissieux, à Saint-Priest, est bien connu des adhérents du CORA-Rhône pour son rassemblement automnal d'Oedicnèmes criards *Burhinus oedicnemus*. Ce regroupement postnuptial, qui a déjà fait l'objet d'articles dans *L'Effraie*, présente les plus importants effectifs observés dans le département, ainsi que les dates de stationnement les plus tardives. En 2009, celles-ci ont été particulièrement remarquables avec une dernière observation d'Oedicnèmes le 15 décembre, ce qui repousse de trois semaines le précédent « record ».

Les effectifs dénombrés

« Le Capot » accueille chaque année, depuis 2006 au moins, des effectifs supérieurs à 100 individus, ce qui indique que cette parcelle regroupe des oiseaux issus d'un territoire très vaste (CHAZAL & TISSIER 2007a).

En 2009, ce site a été le seul regroupement postnuptial régulièrement observé dans l'est du Grand Lyon. Il a compté un maximum de 148 individus le 26 septembre. L'effectif maximal dénombré sur ce site était de 204 oiseaux en 2007 (ROLLET, CHAZAL & TISSIER 2007) et 173 en 2008 (INFO ORNITHO 2009 in *L'Effraie* n°25). On constate donc un déclin sensible, difficile à interpréter dans la mesure où l'on ne connaît pas le territoire en provenance duquel les oiseaux se concentrent à Manissieux.



Oedicnèmes criards, Le Capot, 5 novembre 2009

Chronologie du stationnement

Les observations ont été principalement effectuées tôt le matin ou en fin de journée afin de profiter du moment où les oiseaux sont à la fois actifs (et donc visibles) et rassemblés.


Sur le graphique suivant, on peut voir l'évolution des effectifs dénombrés en fonction de la température (données de la station météorologique de Lyon-Bron).

Les dernières observations d'Oedicnèmes ont eu lieu le **15 décembre**, ce qui constitue de loin la **mention la plus tardive de cette espèce en région Rhône-Alpes**. Le précédent record régional datait en effet du 23 novembre 1964 en Isère (DELIRY 2007) !

Le schéma général est celui d'une augmentation rapide à partir de fin septembre, puis d'un déclin en plusieurs étapes.

La première phase correspond à une concentration rapide des oiseaux sur le site, probablement suite à l'ouverture de la chasse et aux labours d'automne faisant fuir ceux des autres groupes tels ceux de

Lentilly, Brindas, Chassagny, Saint-Andéol, Bully, Chazay-d'Azergues, etc. (ROLLET, CHAZAL & TISSIER 2007 - TISSIER 2007a).



Evolution de l'effectif d'août à décembre 2009, tendance et températures relevées à Lyon-Bron

Une première vague de départs se produit dans la dernière décade d'octobre, comme les années précédentes. La décrue se poursuit rapidement dans la première décade de novembre, puis, fait nouveau en 2009, l'effectif se stabilise autour d'une quarantaine d'oiseaux pendant un mois. Il décroît enfin dans le courant du mois de décembre (22 oiseaux le 7 décembre, 11 le 14 décembre, 7 le 15 décembre). La vague de froid survenue à partir du 12 finit par avoir raison de ce regroupement : plus aucun oiseau n'est visible le 17 dans les parcelles recouvertes de neige.

Des artefacts de prospection expliquent probablement les « dents de scie » de la courbe. Il est en effet possible, mais assez peu probable, que ce site, sans qualité écologique particulière, reçoive des apports d'individus plus nordiques. Son attractivité est plus probablement restreinte aux oiseaux locaux.


En comparant les courbes d'effectifs et de températures minimales des années 2006 à 2009, on constate que, dans chaque cas, un départ important se produit dans la dernière décade d'octobre après un épisode froid (TISSIER 2007a - ROLLET, CHAZAL & TISSIER 2007 - D'ADAMO & DALLARD 2008). Mais cet épisode est, dans chaque cas, très bref, suivi d'un important redoux, et la chute d'effectifs n'est qu'approximativement synchronisée. En 2008, les départs se poursuivent alors que les températures restent stables. En 2009, l'effectif se stabilise en dépit de deux brefs épisodes froids (8 novembre et 5 décembre). D'autres facteurs semblent donc en jeu.

En revanche, il est vraisemblable que la douceur constatée fin novembre 2009, avec des températures minimales de 5 à 10°C, a joué un rôle dans le maintien très tardif d'un groupe de 20 à 40 oiseaux. Les brèves gelées ne durcissant pas le sol, ces individus réussissaient sans doute à trouver leur nourriture. Cette courbe signifie peut-être l'existence, dans ce groupe d'Oedicnèmes, de deux stratégies distinctes de migration. Une partie des individus (les deux tiers environ) déserte le site fin octobre quelle que soit la température, semblant obéir à des facteurs fixes d'année en année, une stratégie qui équivaut à « anticiper » l'épuisement hivernal des ressources en invertébrés. Les autres semblent

tenter de rester sur le site tant que les conditions climatiques le permettent, au risque d'être surpris par une vague de froid. Ces derniers oiseaux sont, dans cette hypothèse, des candidats à l'hivernage sur le site.

Utilisation de l'espace

Jusqu'au 28 novembre, les oiseaux sont en totalité ou en forte majorité observés sur la parcelle du « Capot » (parcelle 1 sur la carte suivante). Pendant cette période, de manière irrégulière, des oiseaux sont observés sur deux parcelles très proches du « Capot », au lieu-dit « Plaine de Manissieux » (n°2 sur la carte). En sommant alors les chiffres obtenus, on constate qu'il s'agit d'un seul et même groupe qui se disperse parfois, suite à un dérangement ou aux allées et venues des oiseaux cherchant leur nourriture.



Parcelles utilisées par le groupe d'Oedicnèmes de Manissieux en 2009

A partir de fin novembre, les effectifs augmentent à « Plaine de Manissieux ». En décembre, la parcelle du Capot est vide et les oiseaux sont systématiquement observés sur une parcelle du lieu-dit « Plaine de Manissieux », occupée par une céréale d'hiver, sur laquelle ils n'avaient jamais été vus auparavant, à un kilomètre à l'est du « Capot » (n°3). Une première observation (9 oiseaux) a lieu également le 4 décembre au « Petit Champ Dolin », un kilomètre à l'ouest.

Comme rien n'a changé par ailleurs au « Capot », il est difficile de comprendre les raisons de ce déplacement. Les travaux agricoles de retournement et de semailles ont eu lieu simultanément sur les deux parcelles, bien avant le changement. L'épuisement local des ressources alimentaires est une explication peu plausible car les groupes postnuptiaux se nourrissent habituellement sur un territoire de quelques kilomètres de rayon autour de leur parcelle de repos diurne. Peut-être les oiseaux stationnés au « Capot » ont-ils subi un dérangement répété se produisant en-dehors des heures de passage de l'observateur (promeneur ou chien). Enfin, les derniers individus observés pendant l'épisode froid de mi-décembre s'étaient de nouveau déplacés vers la parcelle 2, mieux abritée du vent du nord.

Le regroupement du Capot a battu en 2009, pour la troisième année consécutive, le record de la date de présence de l'espèce la plus tardive. De plus, ce record a été repoussé de cinq semaines en trois ans. Ces constats restent difficiles à interpréter en l'absence de points de comparaison, par exemple avec

le suivi d'autres groupes situés à quelque distance. L'hypothèse selon laquelle le site du Capot, quasiment inclus dans l'agglomération lyonnaise, bénéficierait de températures plus clémentes par « effet ville », ne semble pas tenir. En effet, les températures relevées à Lyon-Bron - site dont l'enclavement urbain est comparable à celui de Manissieux - ne sont, en moyenne, supérieures à celles de Lyon-Saint-Exupéry (en « rase campagne ») que d'un demi-degré tout au plus, en novembre et décembre.

Quoiqu'il en soit, ce site reste le site de regroupement postnuptial majeur du département et son étude est essentielle à plus d'un titre.

Cyrille FREY

N.D.L.R. : rappelons que ces recherches de rassemblements se placent dans le cadre des études menées depuis 1998 par le CORA-Rhône sur cette espèce, dans un partenariat remarquable avec la Mission Ecologie Urbaine du Grand Lyon (GAGET, CHAZAL, TISSIER, GAILLARDIN, DALLARD, D'ADAMO, FREY 1998-2009). Notons également encore une fois le caractère exceptionnel et sans doute unique en Europe de tels rassemblements si près d'une grande agglomération comme le Grand Lyon (CHAZAL & TISSIER 2007a).

Merci à tous les observateurs dont certains furent très assidus : Cyrille FREY, Christophe D'ADAMO, Edouard RIBATTO, Myriam VERDIER, Olivier ROLLET, Gilles CORSAND, Jean-Paul RULLEAU, Romain CHAZAL, Nicole CARRET, Martine MATHIAN, Jonathan JACK, Pierre CHICO-SARRO, Philippe PADES, Dominique TISSIER, Léa HILAIRE et Fabien DUBOIS.

Bibliographie

- CHAZAL R. & TISSIER D. (2007a). Programme de sauvegarde de l'Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* dans le Grand Lyon. *Ornithos* n°14-6.
- CHAZAL R., TISSIER D. et CORA (2005, 2006 et 2007b). *L'Oedicnème criard dans la Communauté Urbaine de Lyon*. CORA-Rhône, rapport d'étude, Grand Lyon.
- D'ADAMO Ch., DALLARD R. et CORA (2008). *L'Oedicnème criard dans la Communauté Urbaine de Lyon*. CORA-Rhône, rapport d'étude, Grand Lyon.
- DELIRY C. (2007). *Les oiseaux du Paléarctique occidental en Rhône-Alpes et en Isère*. <http://cyrille.deliry.free.fr/oiseauxpw6b.htm>
- GAGET V., TISSIER D. et CORA (1998, 1999, 2000, 2001 et 2002). *L'Oedicnème criard dans la Communauté Urbaine de Lyon*. CORA-Rhône, rapports d'étude, Grand Lyon.
- GAGET V., TISSIER D., GAILLARDIN Ch. et CORA (2004). *L'Oedicnème criard dans la Communauté Urbaine de Lyon*. CORA-Rhône, rapport d'étude, Grand Lyon.
- INFO ORNITHO (2009). Les rassemblements d'Oedicnèmes criards de 2008. *L'Effraie* n°25. CORA-Rhône, Lyon.
- ROLLET O., CHAZAL R. & TISSIER D. (2007). Le rassemblement d'Oedicnèmes criards de Saint-Priest en 2007. *L'Effraie* n°22. CORA-Rhône, Lyon.
- TISSIER D. (2006). Répartition de l'Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* dans le Rhône. *L'Effraie* n°19. CORA-Rhône, Lyon.
- TISSIER D. (2007a). Note sur les rassemblements de l'Oedicnème criard en 2006 dans le Rhône. *L'Effraie* n°20. CORA-Rhône, Lyon.
- TISSIER D. (2007b). *L'Oedicnème criard dans le Grand Lyon*. Brochure éditée par le CORA-Rhône, Lyon.
- VAUGHAN R. & VAUGHAN-JENNINGS N. (2005). *The Stone Curlew Burhinus oedicnemus*. Isabelline Books, Falmouth.

Les Faucons pèlerins du Rhône : nouveau nichoir pour l'espèce à la Part-Dieu



On sait qu'un couple de Faucons pèlerins *Falco peregrinus* a élu domicile depuis 2003 sur la torchère sud de la raffinerie de Feyzin et qu'il s'y reproduit depuis 2005 au moins (TISSIER & GAGET in *L'Effraie* n°20, CORA-Rhône, Lyon 2007). Après la reproduction de 2007, un nichoir a été installé sur la torchère, avec l'aide des services techniques de l'entreprise TOTAL (fide V. GAGET, P. TISSOT et J.P. FAVERJON de la LPO-Loire). Le couple s'y est reproduit avec succès en 2008, 2009 et 2010.

Ce sont entre 10 et 15 jeunes Faucons pèlerins qui se sont envolés de la raffinerie depuis 2003 !

Début avril 2009, un autre nichoir a été installé sur une cheminée principale de la raffinerie pour anticiper les travaux de réparation qui pourraient être menés dans quatre ans sur la torchère. Notons la bonne coopération de l'entreprise TOTAL avec le CORA-Rhône et la LPO-Loire sur cette affaire.

On se rappelle que deux nichoirs avaient été également installés, avec l'aide d'un hélicoptère de RTE, en octobre 2006, sur les châteaux d'eau des Grandes Terres, plateau agricole des communes de Corbas, Vénissieux et Feyzin (voir *L'Effraie* n°20).

Les Faucons trouvent facilement des proies en milieu urbain, comme les pigeons domestiques et sauvages, probablement aussi les Etourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris*, les corvidés et quelques laridés en hiver. On sait que l'espèce s'est installée dans de nombreuses villes françaises ces dernières années (voir à ce sujet le numéro 20 de *L'Effraie*). Quelques observations hivernales et printanières à Lyon (Port Édouard Herriot, Croix-Rousse, Part-Dieu, Fort de Villeurbanne, Monplaisir), ainsi qu'à Villeurbanne ou Vénissieux, pouvaient laisser espérer la nidification d'un second couple dans le Grand Lyon, ou ailleurs dans le département, en 2009.

Sans qu'on ait pu en obtenir une preuve certaine, il est possible qu'un couple se soit reproduit ou ait au moins tenté une nidification au printemps 2009, peut-être même dans les années antérieures, dans le quartier de la Part-Dieu du 3^e arrondissement de Lyon, sur la tour dite UAP, peut-être dans un nid inoccupé de corvidés.

Cette tour devant bientôt être détruite suite au projet de rénovation du quartier (avec, en particulier, la construction de la tour INCITY), le CORA-Rhône et la LPO-Loire ont mené les démarches (toujours longues et fastidieuses) pour que soit installé un nouveau nichoir.

Sous la houlette de notre spécialiste, Jean-Pascal FAVERJON, de la LPO-Loire, un modèle métallique a été fixé le 8 février 2010, rue des Cuirassiers, sur la façade « est » de la tour dite EDF, à 75 mètres du sol, par une équipe d'alpinistes du bâtiment.



La Foncière des Régions, propriétaire de la tour EDF, a accepté de participer à cette opération inhabituelle. Pour cet organisme, ce genre d'action permet de montrer son souci de contribuer à la protection de la biodiversité. A noter qu'un nichoir avait été placé en 2009 sur une de ses tours dans le

quartier de La Défense (Hauts-de-Seine), en région parisienne ; à cette occasion, il a été montré que, en éloignant les pigeons, les faucons concourent à maintenir les bâtiments moins souillés de fientes.



On sait que c'est aussi l'argument principal toujours avancé par notre association dans les polémiques sur les souillures des pigeons urbains : l'implantation d'une espèce prédatrice comme le Faucon pèlerin, solution naturelle, écologique et finalement bien plus économique, est préférable à toutes les autres !

Il n'est évidemment pas certain que les faucons adoptent immédiatement ce nichoir, mais le succès rencontré à Feyzin incite à l'optimisme. La suite de l'aventure dans cette revue !...

L'hiver 2009-10 et ses oiseaux, plongeurs, grèbes, harles, fuligules à Miribel-Jonage, Anse et ailleurs...

Après un hiver 2008-09 plutôt froid, faisant suite à plusieurs hivers doux, voire chauds, celui de 2009-10 a été assez long et froid, avec des périodes de gel en janvier. Nous avons donc eu, comme l'an dernier, nombre de citations d'oiseaux d'eau inhabituels sur nos plans d'eau, à Miribel-Jonage bien sûr, mais aussi à la gravière de Joux, à Arnas, et ailleurs...

Il serait fastidieux pour le lecteur de citer ici, pour chaque espèce, les noms de tous les observateurs, sachant que ces sites attirent toujours quasi tous les ornithologues amateurs de la région lyonnaise. On retrouvera leur nom dans les chroniques mensuelles.

Les fuligules ont été très nombreux à Miribel-Jonage (jusqu'à près de 5000 environ) alors que les canards de surface ont été gênés par le gel des plans d'eau et n'ont pas atteint des effectifs très importants. Il y a eu, par exemple, relativement peu de **Canards pilets** *Anas acuta* (de 1 à 10, mais 3 dès le 17 octobre), de **Canards siffleurs** *Anas penelope* (moins de 40, mais un précoce le 3 octobre) et de **Canards souchets** *Anas clypeata* (9 en novembre, moins de 5 ensuite, mais 22 migrateurs à Grigny le 6 novembre). Les **Garrots à œil d'or** *Bucephala clangula* ont été notés comme d'habitude, mais en nombre, semble-t-il, moins élevé qu'à l'accoutumé.

L'observation, le 6 décembre 2009, de 3 **Oies rieuses** en vol au-dessus du Grand Parc fait suite à la première départementale de l'hiver dernier (J.M. BELIARD in INFO ORNITHO de l'Effraie n°27).

Une **Bernache nonnette** *Branta leucopsis* est signalée le 3 janvier au même endroit.

Les **Fuligules nyrocas** *Aythya nyroca* ont ouvert la séance des raretés dès le 28 septembre, date à laquelle un oiseau vraiment précoce (ou frileux !) est observé à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD), puis avec au moins 5 individus tout l'hiver. L'espèce devient de moins en moins rare au fil de ces dernières années et n'est d'ailleurs plus soumise à homologation régionale depuis 2006. Difficile de faire le compte des oiseaux différents, entre ceux qui restent plusieurs jours ou semaines, ceux qui arrivent ou ceux qui partent.

Un nombre inhabituellement élevé de **Fuligules milouinans** *Aythya marila* a été cité par les nombreux observateurs, les premiers dès le 13 décembre, avec un maximum de 9 oiseaux en février, comme d'habitude tous en plumage femelle ou immature.

Les harles sont encore plus rares dans notre département et c'est un **Harle piette** *Mergellus albellus*, le plus petit et le plus beau, qui s'est montré dès le 24 décembre à Miribel-Jonage. L'espèce sera signalée jusqu'à début février avec un ou deux individus. Des **Harles bièvres** *Mergus merganser* passent en janvier avec un maximum de 15 oiseaux à Miribel-Jonage et de 8 oiseaux au Grand Large où un individu est encore observé le 2 avril ! Comme pour les fuligules, il est difficile de faire le compte total des oiseaux ayant transité par le site, ne pouvant différencier ceux qui restent de ceux qui ne font que passer ! Mais toujours pas de Harle huppé *Mergus serrator*, décidément très accidentel dans le Rhône.

Les **Macreuses brunes** *Melanitta fusca*, absentes l'hiver précédent, se signalent cette fois avec 2 oiseaux le 6 février à Miribel-Jonage et 4 à Bourdelan d'Anse où elles vont séjourner du 4 janvier au 3 mars au moins !

Un groupe de 7 **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* passe le 13 décembre au Grand Large, tandis qu'un **Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea* est noté le 3 mars sur le site de Bourdelan d'Anse, où un **Harle couronné** *Lophodytes cucullatus* mâle, d'origine inconnue, est observé du 28 février au 3 mars ! Deux observateurs arrivent trop tard le 6 mars pour constater son départ, mais notent une **Hirondelle rustique** chassant (mais quoi ?) sous la neige !!!



Le **Plongeon imbrin** *Gavia immer* immature est présent du 5 décembre au 2 avril au moins au Grand Large, séjour remarquable par sa longueur et par le fait que l'espèce est notée désormais chaque hiver. C'est curieusement le plongeon le moins rare dans notre département, alors que les deux autres espèces de ce genre sont réputées plus fréquentes en hivernage.

Un **Plongeon arctique** *Gavia arctica* est noté au Grand Large à partir de fin janvier, avec un séjour également particulièrement long puisqu'il est encore noté le 26 avril ! 2 individus sont observés aussi le 28 janvier à Anse où l'un est encore présent le 3 mars sur le site de Bourdelan, mieux suivi cette année, ce qui a permis de noter, outre les Macreuses brunes et le Tadorne casarca déjà cités, 4 **Canards pilets**, 1 **Canard siffleur** et 2 **Harles piettes**, ainsi que 2 à 3 **Garrots à œil d'or** de fin janvier à début février, avec même, en prime, un **Butor étoilé** en vol entre deux roselières le 28 janvier (J.P. RULLEAU) !



Le site de la Feysine, à Villeurbanne, a également accueilli plus d'oiseaux que d'habitude, sans doute du fait du gel de certains plans d'eau : ainsi, un **Canard pilet** mâle y est noté avec 2 **Garrots à œil d'or** le 31 janvier et une trentaine de **Fuligules morillons** sont présents les 14 et 16 février, alors que les fuligules y sont plutôt rares.

Quelques **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* (maximum de 5) sont notés de septembre à décembre à Miribel-Jonage ou au Grand Large, ainsi qu'un **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* le 22 décembre ! Un **Grèbe esclavon** *Podiceps auritus* est observé le 6 février sur l'étang des Eaux-Bleues et 2 sont à Bourdelan d'Anse le 3 février.

Un **Goéland pontique** *Larus cacchianus* adulte est cité le 6 décembre au Grand Large (G. BRUNEAU). L'espèce est toujours assez délicate à identifier et son homologation nécessite de noter la convergence de plusieurs critères décisionnels. D'où la grande rareté des mentions, alors qu'on peut penser que d'autres oiseaux passent inaperçus, en particulier des immatures.

Parmi les ardéidés, signalons 8 **Grandes Aigrettes** *Casmerodius albus* à Miribel-Jonage le 9 décembre (voir notre article dans ce même numéro sur l'hivernage de l'espèce). Elle est notée aussi, en décembre et janvier, à Marennes, à Grigny, à la gravière de Joux d'Arnas et un groupe de 12 est observé en vol à Echalas le 19 décembre (E. RIBATTO). Les Aigrettes garzettes *Egretta garzetta* semblent avoir fui le froid dès la mi-octobre, dernière citée le 11 de ce mois !

Pour la petite histoire, signalons ce **Pélican frisé** *Pelecanus crispus* adulte, observé le 6 février au lac du Drapeau (D. & G. TISSIER) en provenance probable du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, ainsi qu'une **Callopsitte élégante** *Nymphicus hollandicus* le même jour, au même endroit !

Et, pour rester dans les espèces exotiques, mentionnons aussi ce **Cygne noir** *Cygnus atratus* qui a erré du Grand Large à Vernaison, en passant par la Feyssine, Lyon centre, etc., d'octobre à mars !

Deux **Jaseurs boréaux** *Bombycilla garrulus* sont brièvement observés (Alain CHABROLLE) dans un jardin de Charbonnières le 13 février ! Ce sera la seule observation de cette espèce qui ne s'observe en grand nombre que lors d'invasions comme l'inoubliable de l'hiver 2004-05 !

Mais la star de l'hiver a été incontestablement l'**Harelde boréale** *Clangula hyemalis*, objet de la note ci-après !...



Une Harelde boréale séjourne longuement dans le Rhône

Une Harelde boréale *Clangula hyemalis* a fait les gros titres des messages envoyés par les ornithologues du Rhône cet hiver sur le « web » !

En effet, un canard de cette espèce a séjourné du 15 janvier au 8 février 2010 au moins, évidemment dans notre Grand Parc de Miribel-Jonage qui draine les oiseaux rares et... leurs observateurs !

Or l'espèce est très rare dans notre département, la dernière observation dans le Rhône datant de près d'une vingtaine d'années.

Si l'on retrouve dans les archives du CORA-Rhône une ancienne donnée de février 1977, c'est en effet le 1^{er} décembre 1990 qu'un immature avait été observé (A.RENAUDIER, L.MANDRILLON, D.TISSIER in Base de données du CORA-Rhône 2001), déjà à Miribel-Jonage, par un temps de brouillard et de

froid tellement intense que les observateurs n'étaient même pas sortis de leur véhicule, à une époque où le Parc n'était pas aménagé comme aujourd'hui et où l'on allait, de lac en gravière inondée, en voiture, au risque d'y laisser un amortisseur !

A noter peut-être aussi l'observation d'un immature le 2 janvier 1986 à Saint-Pierre-de-Bœuf, dans le département voisin de la Loire, sur la retenue du barrage de la centrale hydroélectrique construite en 1977 sur le Rhône (D. TISSIER in Base de données du CORA-Rhône 2001).

Ce petit canard plongeur niche dans toutes les régions arctiques de notre planète, Islande, Spitzberg, nord de la Scandinavie et de la Sibérie, côtes du Groenland et nord du Canada, dans les marais et mares de la toundra, sur les côtes et les petits étangs de montagne. En Europe, il hiverne surtout sur les rivages de la Mer Baltique et sur les côtes occidentales de Norvège, en groupes denses et souvent loin du rivage. Il descend rarement au sud de la Mer du Nord, sauf lors des hivers très rudes (DUQUET 1993 : *La faune de France, inventaire des vertébrés et principaux invertébrés*).

En France, on l'observe chaque hiver, principalement de novembre à mi-mars, sur le littoral de la Mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique, mais toujours en petit nombre (quelques dizaines d'oiseaux seulement chaque année avec une grande variabilité selon la rudesse de la saison), encore plus rarement le long du littoral méditerranéen, en particulier en Camargue où il est toutefois régulier. Il peut être observé très occasionnellement dans les étangs et plans d'eau de l'intérieur, surtout sur le cours du Rhin et le Lac Léman (DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO & YESOU 2000 : *Inventaire des oiseaux de France*).

L'espèce se caractérise par une mue annuelle complète et deux mues annuelles partielles entraînant une grande variabilité du plumage, combinant cependant toujours le blanc, le brun et le noir, selon la saison, le sexe et l'âge de l'oiseau : ainsi, le mâle adulte d'hiver est en grande partie blanc avec des taches brunes aux joues, à la poitrine et aux ailes et un grand filet de 13 centimètres à la queue, alors que la femelle et les immatures sont plutôt bruns, avec plus ou moins de blanc à la tête et au cou. Mais en plumage nuptial, mâle et femelle deviennent surtout brun foncé, avec quelques marques blanches à la tête et les parties inférieures blanches (MULLARNEY, SVENSSON, ZETTERSTRÖM & GRANT 1999 : *Le guide Ornitho*).

Cet hiver, un nombre plus élevé d'individus que les années précédentes a été observé, hors du littoral de la métropole, suite bien sûr aux températures basses qui ont duré assez longtemps. Ainsi, l'espèce a été signalée dans l'Ain (2 ind.), au Pouzin (Drôme), en Alsace (au moins 3 oiseaux), sur la base de Jablines (Seine-et-Marne) et même en Corrèze, etc., de mi-novembre jusqu'à mi-avril environ.



L'oiseau de Miribel-Jonage était en plumage de 1^{er} hiver, surtout brun, avec quelques marques blanches à la tête, au cou et aux scapulaires.

D'après J.M. BELIARD, toujours assidu sur le site, la coloration du plumage a beaucoup évolué depuis sa découverte, davantage de blanc apparaissant sur les scapulaires, ce qui ferait pencher pour un mâle immature de 1^{er} hiver, ce que pourrait confirmer un peu de sombre à la base du bec, mais sans certitude.

Il a fait en tout cas le bonheur de quasiment tous les ornithologues amateurs du département qui ont eu tout le loisir de venir l'observer sur le Lac du Drapeau ou celui des Eaux-Bleues. Espérons qu'il ne faudra pas attendre encore 20 ans pour revoir l'espèce dans le Rhône ! Quoique ce ne soit pas un signe très encourageant pour les observateurs frileux !...

Un Pic mar au Parc de Lacroix-Laval

Le Pic mar *Dendrocopos medius* est une espèce d'observation très rare dans le Rhône.

Légèrement plus petit que le Pic épeiche *Dendrocopos major*, comme l'indique son nom scientifique, il s'en distingue facilement, si on le voit dans de bonnes conditions, par quelques critères importants qu'il faut penser à relever (MULLARNEY, SVENSSON, ZETTERSTRÖM & GRANT 1999 : *Le guide Ornitho.*) :

- La face présente plus de blanc sur les côtés, sans « moustache » noire
- Le bec est plus court et plus fin
- Les flancs sont striés de sombre
- La calotte est rouge, plus vif chez le mâle
- Les sous-caudales sont roses et non pas rouge vif

Attention, ces deux derniers critères peuvent se retrouver chez le Pic épeiche juvénile qu'on reconnaîtra à sa « moustache », ce trait noir atteignant la base du bec, et au fin bord noir de la calotte rouge ! Le Pic mar donne aussi l'impression d'une tête nettement plus claire avec, en particulier, l'œil ressortant bien sur fond blanc.

L'espèce vit dans les forêts de feuillus en plaine, surtout les vieilles chênaies où il se nourrit d'insectes et de sève.



Son aire de répartition couvre l'Europe et la Turquie, mais il y est très inégalement réparti : très rare et localisé en Espagne et en Italie, il est plus abondant dans l'est de l'Europe, de l'Allemagne à la Russie et l'Ukraine.

En France, où l'effectif est estimé entre 50 et 100 000 couples, il est commun dans le nord-est (Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne), ainsi que dans le sud-ouest du Massif central, la Bourgogne, l'Allier et le centre. On le trouve aussi en Bretagne, Normandie, Franche-Comté, mais il est rare et localisé en Poitou-Charentes et dans le sud-est du pays. Il est absent des bordures occidentales de la France en-dessous de Nantes et de tout le quart sud-est (DUBOIS, LE MARECHAL, OLIOSO & YESOU 2000 : *Inventaire des oiseaux de France*).

En Rhône-Alpes, il est très rare et vraiment en limite sud de son aire de répartition, sauf dans le pays de Gex (Ain) et la basse vallée de l'Ain où il semble assez commun. On ne le trouve que dans l'Ain et la Savoie, tout au nord de la région.

Le site où il est le plus facile à voir est la forêt de Seillon, au sud de Bourg-en-Bresse, connue des ornithologues régionaux pour abriter les six espèces de pics de France, quoique le Pic cendré *Picus canus* y soit maintenant très rarement contacté (R. RUFER comm. pers.) (et non compris les très rares Pic tridactyle *Picoides tridactylus* et Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos*).

On manque de connaissances pour avoir une idée précise de l'évolution des effectifs, car c'est une espèce discrète et il est toujours difficile de prospecter dans les forêts qui, d'ailleurs, n'attirent guère les observateurs ! Cependant, il semble que, après une régression au début du XX^e siècle, le Pic mar ait amorcé une lente progression géographique depuis les années 1960 (DUBOIS et al. *in supra*).

Serait-ce le cas dans le Rhône ?

Après une observation aux Grands Vernes, dans le Parc de Miribel-Jonage, le 8 avril 2006 à 9h30 (Olivier ROLLET), l'espèce vient d'être recontactée au Parc de Lacroix-Laval (commune de Marcy l'Etoile) par Olivier WAILLE (comm. pers.) :

- ◆ le 17 avril 2008, à l'ouest de la forêt de Champdit située en bas de ce grand parc riche en feuillus, en chênaie-charmaie principalement, un mâle est observé pendant près d'une minute à sept mètres de distance et trois mètres de hauteur, donc bien identifié, avec tous les critères relevés !
- ◆ le 31 janvier 2009, à l'est de la forêt de Champdit, des cris caractéristiques sont entendus au loin, puis un tambourinage, et l'oiseau est observé, mais seulement cinq secondes, se déplaçant sur une branche sèche horizontale de chêne, à grande hauteur (quinze mètres), puis rapidement perdu de vue, laissant un peu de frustration à l'observateur !...
- ◆ très discret, l'oiseau ne sera retrouvé que le 26 décembre 2009 à 17h30, toujours dans la forêt de Champdit, au parc de Lacroix Laval, pendant une durée de trente secondes...


Ces données sont bien sûr trop peu nombreuses pour avancer une conclusion ; même si les trois dates ci-dessus peuvent laisser penser à un oiseau mâle cantonné, aucun couple n'a été contacté et l'espèce garde donc son statut d'erratique occasionnel, tel que défini dans la liste des Oiseaux du Rhône (TISSIER *in l'Effraie* n°22). Mais il convient désormais d'être vigilant si l'on prospecte dans des forêts favorables à l'espèce. Toute donnée devra être avantageusement rapportée dans notre base de données sur le site www.corafaunesauvage.fr et faire l'objet d'une fiche d'homologation la plus précise possible à soumettre au CHR.

Merci aux observateurs qui ne laissent pas leurs données dans leur carnet de terrain !

En espérant d'autres observations !



Pic mar (photo : Jules FOUARGE)



Les chroniques départementales mensuelles du Rhône en 2009

Liste des observateurs

AC	Alain CHABROLLE	EIB	Elyanne BOISSIERE	MCF	Marie-Claude & Charles FREY
AD	Andrée DUPLATRE	EmA	Emmanuel AMOR	MD	Michel DUPUPET
AdC	Adeline CROZE	EmG	Emilien GONZALEZ	MéB	Mélanie BENSA
AdM	Adrien MESKEL	EPR	Elisabeth & Philippe RIVIERE	MK	Michel KERDRAON
AFe	Alain FERRIER	ER	Edouard RIBATTO	MiC	Michelle CHARRONDIERE
AG	Antony GARCIA	ErB	Eric BROUTIN	MiG	Michèle GUINNET
AgT	Agnès TRIBOULET	ES	Emmanuelle SPEH	MiP	Michaël PEREZ
AGz	Alain GOMEZ	EwT	Erwann THEPAUT	MM	Martine MATHIAN
AL	André LAMY	FaB	Fabrice BASSOMPIERE	MP	Mylène PERRIN
ALC	Alice LE COZ	FaD	Fabien DUBOIS	MV	Myriam VERDIER
AIM	Alexandre MACCAUD	FD	Frédéric DOMENJOUR	MxM	Max MEGARD
AIR	Alexandre ROUX	FLG	Frédéric LE GOUIS	NC	Nicole CARRET
AnC	Antoine CHABROLLE	FID	Flora LORIDAT	NR	Nicolas RIVOLLIER
ARu	Alain RUFER	FM	François MARTEL	NT	Nathalie TILLET
AU	André ULMER	FrT	Franck TRIBOULET	NZ	Nicolas ZIMERLI
AuB	Audrey BRUGEMAN	GB	Gilles BARNOUIN	OC	Olivier CAPARROS
AV	Angeline VALERO	GBu	Guillaume BRUNEAU	OI	Olivier IBORRA
AxB	Alexia BATHEYRON	GD	Georges DAVID	OR	Olivier ROLLET
AxR	Alexandre RICHIN	GF	Gaël FOILLERET	OW	Olivier WAILLE
BaT	Basile TACHON	GiT	Gilles TEIL	PA	Paul ADLAM
BD	Bertrand DI NATALE	GT	Guillaume TISSIER	PaB	Patrick BURGALETA
BDG	Bruno DEGRANGE	HP	Hubert POTTIAU	PaM	Pascale MINJARD
BeV	Benoît VIALON	IL	Idaline LAIGLE	PC	Pierre CROUZIER
BoB	Boris BLAY	JB	Julien BOUNIOL	PDC	Philippe DESCOLLONGES
BR	Brigitte RUFFIN	JdS	Jacques de SAVIGNY	PeV	Perrine VIALLAND
BTh	Benjamin THINON	JéB	Jérôme BERRUYER	PF	Patrice FRANCO
CaC	Camille CHOPPARD	JGC	J. GIRARD-CLAUDON	PGi	Pascale GIROUD
CC	Claire CHATAGNON	JGz	Jean-Louis GOMEZ	PhP	Philippe PADES
CCa	Camille CARRET	JJ	Jonathan JACK	PhP	Philippe PADES
CdA	Christophe D'ADAMO	JL	Jacques LAVAU	PiB	Pierre BENSA
CeP	Cécilia PYNSON	JLB	Jean-Luc BANCEL	PT	Pascal TISSOT
CF	Cyrille FREY	JMa	Jean-Paul MALLETT	PYJ	Pierre-Yves JUILLET
CFr	Charles FREY	JMV	Jean-Marc VIGHETTI	RB	René BRULIN
ChL	Christelle LORENZETTI	JMA	Jean-Michel AMARO	RC	Romain CHAZAL
ChM	Christian MALIVERNEY	JMB	Jean-Michel BELIARD	RD	Roland DALLARD
ChP	Christian PRIGENT	JoV	Joseph VERICEL	RF	Robert FERLAT
ChS	Chloé SPITZ	JP	Jacques PALLAMA	RL	Rémi LEDYS
ChV	Christine VALEX	JPF	Jean-Pascal FAVERJON	RoF	Roger FIRMIN
CIR	Clément ROUARD	JPM	Jean-Paul MALOD	RR	Rémi RUFER
CMA	Christophe MAUVAIS	JPR	Jean-Paul RULLEAU	SC	Sorlin CHANNEL
CoL	Cosette LECOQ	JuM	Julien MARTINEZ	SéF	Sébastien FARCY
CP	C. PENARD	JW	Julien WALCH	TB	Thomas BLANCHON
CyP	Cyril PALADEL	LaG	Laurent GARNIER	ThM	Thibault MESKEL
DA	Daniel ARIAGNO	LaM	Laurent MOSCATELLO	VaH	Valérie HERIN
DG	Daniel GRAND	LE	Ludmila ESPIAUBE	VaR	Valentin REGULIER
DhM	Déborah MELLET	LeF	Leslie FRANCOU	VaS	Varouyan SARKISSIAN
DiR	Didier ROUSSE	LG	Laurent GIROUD	VGS	Vincent GAGET-SMIRIL
DJT	Danielle et Jan TOURTILLER	LH	Léa HILAIRE	VH	Valentine HERRMANN
DR	Danièle RANDOIN	LLC	Loïc LE COMTE	ViD	Victor DEBIE
DrD	Driss DJEDDOU	LR	L. RASPAIL	XBC	Xavier BIROT-COLOMB
DS	Danièle SCHMITT	MaC	Marc CROUZIER	YB	Yoann BLANCHON
DSi	D. SIVELLE	MaD	Magalie DUBOIS	YTh	Yves THONNERIEUX
DT	Dominique TISSIER	MaF	Marie FREY	YV	Yann VASSEUR
DTh	Daniel THONON	MBz	Manuelle BERETZ	WT	William TACHON
EBo	Eric BOGLAENKO	MC	Marcel CALLEJON		

Cet article reprend les chroniques mensuelles publiées dans les circulaires du CORA-Rhône pour l'année 2009.

Devant le nombre important de données, nous ne pouvons les reproduire toutes et nous ne repreneons que les plus remarquables, mais toutes sont bien évidemment conservées dans notre base, outil indispensable aux études et actions de protection menées par notre association.

Pensez à transmettre vos observations au CORA, soit par fiche manuscrite, soit par mail, soit directement par saisie automatique sur le site www.corafaunesauvage.fr. Merci à tous.

janvier 2009

Le comptage WETLANDS du 17 janvier a donné **19803 oiseaux** (contre 12398 l'an dernier), dont 79% au Grand Large et à Miribel-Jonage (voir notre article dans l'*EFFRAIE* n°26). Cet hiver, particulièrement long et froid, avec un gel des plans d'eau de plusieurs jours en janvier, a vu les rassemblements hivernaux habituels sur ces deux sites, mais avec des effectifs plus élevés.

Par exemple, on a compté jusqu'à près de 200 **Canards chipeaux** à Miribel-Jonage le 23, près de 400 **Sarcelles d'hiver** à mi-janvier, près de 600 **Nettes rousses**, de 2 à 3000 **Fuligules milouins**, 300 **F. morillons**, 8000 **Foulques**, mais aussi 3 **Canards pilets** du 12 au 29 et jusqu'à 32 **Canards siffleurs**. Le petit groupe de 25 à 30 **Garrots à œil d'or** est fidèle au Grand Large, avec un maximum de 123 **Goélands cendrés** en dortoir (comptés le 26, JMB). Par contre, notre célèbre **Eider à duvet** ne s'est pas montré alors qu'il fréquentait le site depuis 1999 !

Le froid nous a amené également quelques oiseaux rares : plongeurs, harles, oies grises et un **Grèbe jougris**. A noter aussi 1 **Fuligule milouinan**, 1 à 5 **F. nyrocas**, 1 à 5 **Goélands bruns**, 1 **Goéland argenté** et une **Mouette pygmée**. Enfin, la tempête du 24 janvier a déporté vers notre département (et ailleurs !) quelques oiseaux pélagiques inhabituels dont quelques **Mouettes tridactyles** et un **Océanite tempête** (voir notre article dans l'*EFFRAIE* n°26 à paraître prochainement). Tous ces oiseaux (ou presque) ont pu être vus par de nombreux observateurs : AFe, AV, BD, CC, CdA, DG, DS, DT, EIB, ER, ES, FaD, FD, GF, JJ, JP, JPM, JPR, LH, MC, MM, MxM, NR, OR, PA, PC, PF, PhP, PYJ, RC, SC, YTh.



Oie cendrée : 1 en vol le 12 à Miribel-Jonage (MC).

Oie riuse : première obs. départementale de l'espèce avec 5 oiseaux le 9 au Grand Large, revus le 10 à Miribel-Jonage (JMB) (voir notre article dans le numéro 26 de l'*EFFRAIE*, obs. à soumettre au CHR).

Tadorne de Belon : 1 à Anse le 8 (FD) et un groupe de 17 au Grand Large le 8 également (MC), 1 à la Feysse le 10 (BD), oiseaux sans doute poussés par le froid ! Encore 1 à Miribel-Jonage le 23 (JMB). Obs. à soumettre au CHR.

Canard pilet : 3 ind. à Miribel-Jonage le 12 (MC), ainsi que le 25 (DT, OR), 3 (les mêmes ?) au Grand Large le 25 (DT, OR, YTh), 3 à Anse le 20 (FD) et 2 au Grand Large le 29 (JMB).

Canard siffleur : signalé uniquement à Miribel-Jonage et Grand Large, de 8 à 32 du 9 au 16 (JMB, DT, OR).

Canard souchet : signalé uniquement à Miribel-Jonage et Grand Large, 3 seulement du 9 au 25 (JMB, DT, OR, MC).

Fuligule milouinan : un mâle au Grand Large le 16 (JMB). Observation à soumettre au CHR.

Fuligule nyroca : de 1 à 5 (4 mâles et 1 fem.) tout le mois à Miribel-Jonage (DT, OR, JMB). Observations à soumettre au CHR. Difficile de distinguer les individus qui restent de ceux qui ne font que passer !

Harle bièvre : 2 au Grand Large le 21 (JPR), puis de 4 à 6 (2 mâles et 4 fem.) à Miribel-Jonage (DT, OR, JMB, JPR).

Harle piette : 1 dès le 9 à Miribel-Jonage (JMB), puis de 3 à 5 jusqu'au 31 (JMB, DT, OR, JPR). Observations à soumettre au CHR.

Plongeon catmarin : 1 à Anse le 4 (JPR) et le 8 (FD), 1 à Gerland sur le Rhône le 6 (JMB). Obs. à soumettre au CHR.

Plongeon imbrin : encore les 2 oiseaux de décembre jusqu'au 9 au Grand Large (PC, JMB), puis chassés par le gel !

Grèbe jougris : 1 ind. harcelé par des Goélands leucophées le 25 (DT, OR, YTh), revu le 29 (JMB) (voir notre article dans l'*EFFRAIE* n°26).

Océanite tempête : 1 oiseau très affaibli sur le barrage de Couzon-au-Mont-d'Or le 25 (GBu), suite de la tempête du 24, c'est la première obs. d'un oiseau vivant dans le Rhône, la seule donnée antérieure du 18/03/1972 concernait un oiseau trouvé mort (voir notre article dans l'*EFFRAIE* n°26). Obs. à soumettre au CHR.

Butor étoilé : rarement observé, un oiseau est posé à Miribel-Jonage (la Bletta) le 25 (AFe) et le 27 (JMB).

Grande Aigrette : 1 à Miribel-Jonage le 10 et le 12 (MC, JMB), 1 à Grigny le 13 (VGS) et 1 à Echallas le 28 (ER).

Aigrette garzette : 1 ind. en vol à Vernaison le 13 (VGS).

Héron garde-bœufs : 1 à Anse le 8 (FD) et 1 en vol sud à Ampuis le 28 (ER).

Cigogne blanche : 1 à Arnas le 9 (JPR), un groupe de 16 en vol le 27 à Feyzin (VGS) et 1 à Irigny le 27 (C. JANVIER & A. GIRAUDO *vide* VGS). Encore 5 à Feyzin le 30 (VGS). S'agit-il de migrateurs très précoces ou d'oiseaux ayant hiverné en France, ceux-ci étant de plus en plus nombreux ?

Milan royal : 2 à Chazay le 4 et 1 à Dommartin le 16 (MM), 3 en vol à Lyon le 16 (VH).

Busard St-Martin : signalé à Rontalon, Montromant, Larajasse (ER), Soucieu (PF, ER), Chasselay et les Chères (LG), St-Laurent-d'Agnay (ER, PA, GF), St-Andéol et St-Bonnet-de-M. (CdA), Quincieux (FD), Arnas (ER) et Condrieu (PA).

Faucon pèlerin : 1 à Montagny le 7 (GF), 1 avec une proie à Feyzin le 8 (PhF), 1 imm. à Grigny le 13 (VGS), 1 mâle à Lyon 7è le 30 (JMB), 1 à Villeurbanne, 1 à Miribel-Jonage et 1 dans l'est lyonnais le 31 (CdA). 1 fem. notée tout le mois à Villefranche (AL) comme l'an dernier, avec qq. proies identifiées : 2 Mouettes rieuses, 2 Pies et 2 pigeons domestiques.

Faucon émerillon : belle obs. d'un ind. en vol le 31 aux Chères (LG).

Vanneau huppé : beaux groupes hivernaux, 48 à Brindas le 3 (ER). 200 à Arnas le 9 (JPR), encore 66 le 10 à Brindas (CdA) et 81 le 25 (ER). 4 aux Chères le 9 (FD), 1 à Larajasse le 10 et à St-Laurent-d'Agnay le 18 (ER), 7 à Givors et 1 à Mornant le 24 (ER).

Bécassine des marais : de 2 à 7 tout janvier, signalées aux Chères (FD) et à Miribel-Jonage (JMB, DT, LH).

Bécasse des bois : rare obs. d'un oiseau en vol à Chasselay le 11 (LG).

Courlis cendré : un oiseau à Miribel-Jonage le 9, puis le 23 (JMB).

Chevalier culblanc : 1 au Rizan le 21 (JPR).

Chevalier guignette : moins signalé que le mois précédent, 2 à Miribel-Jonage le 23 et 1 le 29 (JMB), 3 le 10 (BD) et 1 le 31 à la Feyssine (DT, LH) et 2 à Ampuis le 31 (ER, PA, PF).

Mouette pygmée : rare obs. hivernale d'un oiseau au Grand Large le 26 (JMB).

Goéland argenté : un ind. au Grand Large le 16 (JMB). Observation à soumettre au CHR.

Goéland brun : 2 au Grand Large et 1 à Miribel-Jonage le 16 (JMB). 5 en dortoir au Grand Large le 26 (JMB). Observations à soumettre au CHR.

Goéland cendré : plus nombreux que d'habitude en hivernage, signalés à Anse et Quincieux (FD), à Villefranche (CdA), à la Feyssine (DT), au Parc de la Tête d'Or (MaC), à Gerland (JMB), au Grand Large (DT, OR, LH, JMB) avec un max. de 123 en dortoir le 26 (JMB).

Mouette tridactyle : exceptionnel passage d'oiseaux déportés par la tempête, 5 le 25 à Miribel-Jonage (DT, OR, RB) et 1 au Parc de la Tête d'Or (MaC), 3 à St-Germain-au-Mont-d'Or et 1 au barrage de Couzon le 25 (GBu), 5 sur la Saône en plein Lyon 5è le 25 (GBu), encore 4 à Miribel-Jonage le 26 (MC), 7 au Grand Large et 3 à Pierre-Bénite le 26 (JMB), 2 à Neuville et 8 (dont 4 mortes) à Rochetaillée sur la Saône le 26 (RR), 3 encore à Miribel-Jonage le 27 (JPR). Voir notre article dans l'EFFRAIE n°26.

Effraie des clochers : une en vol à St-Andéol (ER), une à Civrieux (MM), des pelotes à Lantignié (ER), une morte (plumée) aux Haies (PA, PF, ER) et 2 entrant dans un nichoir à Miribel-Jonage (JMB).

Grand-duc d'Europe : des pelotes dans une commune du sud du département (ER, PA, PF).

Chevêche d'Athéna : une seule donnée ce mois, le 11 à Chasselay (LG).

Chouette hulotte : 2 à Thurins dont une capture une proie sur la route le 4 (ER), 1 à Yzeron le 4 et le 16 (ER), 1 à St-Andéol le 9 (CdA).

Hibou moyen-duc : 1 le 3 (ER) et 5 le 28 (PaM) à Brindas.

Martinet à ventre blanc : un groupe de 9 déjà signalé à Tassin le 30 (ER).


Martin-pêcheur d'Europe : signalé à Gerland (JMB), Grigny et Pierre-Bénite (VGS), Irigny (JB), Lyon (MaC), Vaugneray (AxB) et Ampuis (ER).

Pic épeichette : cité à Arnas, Duerne et Yzeron (ER), St-Romain-au-Mont-d'Or (CdA), Grand Large (JPR).

Pic noir : cris à Duerne, Soucieu, Ste-Catherine (ER), un à Ste-Foy-lès-Lyon (VH) et à l'île de la Table Ronde (VGS).

Pipit spioncelle : 7 à Duerne le 1^{er} (ER), 8 à Soucieu le 4 (ER) et 2 à la Feyssine le 31 (DT, RC).

Bergeronnette des ruisseaux : particulièrement bien notée ce mois, comme en décembre, sans doute à cause de la rigueur de l'hiver, jusqu'à 5 oiseaux tout le mois sur les quais du Rhône à Lyon-centre (DT, CdA, LH, ER), aussi notée à



Miribel-Jonage (MC) et au Grand Large (DT, LH, JMB), à Lyon 7^e (JMB), à la Part-Dieu (FW), la Feyssine (BD), Chazay (FD), Millery et Vernaison (VGS) et une à Ampuis le 31 (ER, PA, PF).

Jaseur boréal : remarquable obs. de 5 oiseaux dans un prunelier à Gerland le 26 (JMB). Observation à soumettre au CHR. L'espèce a été observée cet hiver surtout en Alsace et Franche-Comté, mais aussi dans l'Ain.

Grive mauvis : notée à Soucieu (ER), Morancé (FD), Vaux-en-Beaujolais (JPR), les Haies (PA), les Chères (LG), Miribel-Jonage (JMB) et Ampuis (ER, PA, PF), en petit nombre, max. de 9 ensemble.

Roitelet triple-bandeau : 1 à Chaussan le 4 (ER), 1 à Miribel-Jonage le 5 (MC), 1 à Millery le 8 (VGS), 1 à Ste-Foy-lès-Lyon le 16 (GD) et 1 à la Feyssine le 31 (DT, LH).

Mésange nonnette : signalée à Duerne et Chaussan (ER) et à Ste-Foy-lès-Lyon (GD).

Pie-grièche grise : remarquable donnée d'une espèce de plus en plus rare, malheureusement en hiver ! Un oiseau à Echallas le 28 (ER).

Bouvreuil pivoine : rarement cité, mais le froid amène quelques ind. à Duerne, Messimy, Brindas, St-Laurent-d'Agnay, Montromant, Lantignié (ER) et Grigny (VGS).

Bruant fou : rarement cité ici, un ind. à Chasselay le 17 (LG).

Bruant proyer : 10 oiseaux le 18 à Mornant (ER, PA, GF) dont un à la coloration isabelle anormale !

février 2009

En ce mois d'hiver particulièrement froid, les rassemblements habituels d'Anatidés à Miribel-Jonage et au Grand Large avec, entre autres, un max de 105 **C. chipeaux** le 13, max. de 359 **Nettes rouges**, les habituels **F. milouins** et **morillons**, **Foulques** et **Sarcelles d'hiver** (PhP, MC, JMB, DT, MM, PaM, AV, LH, DR, JL, JB, OR, ChS, JPM, RC).

Le petit groupe de **Garrots à œil d'or** (max. de 18) est encore au Grand Large jusqu'au 27 février au moins. A noter 5 **Fuligules milouinans** le 13, 1 **Grèbe à cou noir** le 14 (MC) et 1 **Grèbe jougris** imm. le 27 (JMB), alors que les premiers **Milans noirs** y sont notés le 27.

Des chants de **Mésange charbonnière** le 25 à Lyon (DT) signalent la fin de la froideur de cet hiver !

Oie cendrée : 2 à Miribel-Jonage le 27 (JMB).

Canard souchet : 1 seul noté à Miribel-Jonage fin février (DT, LH, MM, AV, PaM, JMB, PhP).

Canard pilet : 4 le 28 à Miribel-Jonage (DT, LH, MM, AV, PaM).

Harle bièvre : 4 ind. notés à Miribel-Jonage le 25 (PhP).


Harle piette : de 2 à 4 tout le mois à Miribel-Jonage et 1 au Grand Large le 27 (JMB).

Grande Aigrette : une à Montagny le 28 (PA).

Aigrette garzette : 1 en vol à Grigny le 6 (VGS).

Cigogne blanche : 5 posées à Vaulx-en-Velin le 17 (JMB), 1 en vol migratoire à Grigny le 23 (VGS).

Milan royal : 1 à Dommartin (MM) et à Pusignan (CdA) le 8, à Chasselay les 8 et 15 (LG), à Meyzieu le 12, à Soucieu le 19 (PF), à Lyon 5^e le 24 (DT), à Theizé le 27 (JPR), à Yzeron le 28 (NR) et 5 en vol le 28 à St-Didier-sous-Beaujeu (ER, MBz).



Busard St-Martin : 1 fem. ou imm. le 1^{er} à Echallas (ER, PA), 1 mâle le 3 à Cailloux (CdA), 1 fem. à Jarnioux le 8 et 1 mâle à Cogny le 8 (JPR), 1 mâle à Limonest le 11 (MM), 1 à Craponne le 21 (RL).

Faucon crécerelle : 1 mâle blessé à l'aile à Fourvière (IL).

Faucon pèlerin : La femelle de Villefranche est toujours signalée tout février (AL).

Oedicnème criard : arrivée (ou passage ?) très précoce le 9 à Genas (JéB), nouveau record départemental. Cris le 20 (ARu) à Nuelles où il avait été noté le 23 (RR) en 2007.

Vanneau huppé : 12 à Sathonay le 3 (CdA), 43 à Brindas le 3 et 49 le 16 (ER), 130 à Arnas le 9 et 60 le 24 (JPR).

Bécassine des marais : 5 ind. le 28 à Miribel-Jonage (DT, LH, MM, AV, PaM).

Bécasse des bois : rarement observée, un ind. à l'envol le 25 à Odenas (JPR).

Courlis cendré : déjà 2 le 24 à St-Georges-de-Reneins (JPR).

Mouette rieuse : groupes en vol migratoire de 20 à 700 ind. dès le 24 à Lyon (DT).

Mouette pygmée : 1 H1 le 13 et le 27 au Grand Large (JMB).

Goéland cendré : jusqu'à 18 au Grand Large et 1 imm. à Miribel-Jonage (JMB, DT, LH, MM, AV, PaM).

Mouette tridactyle : 2 rescapées encore notées le 4 (JMB) à Gerland (voir notre article dans l'EFFRAIE n°26).

Effraie des clochers : 1 en vol à Brignais, 1 écrasée à Ambérieux et à Brindas (ER).

Grand-duc d'Europe : noté à Ville/Jarnioux (JPR).

Chevêche d'Athéna : notée à Thurins (ALC), à Montrottier, Messimy, Chaponost, Chambost-Longessaigne et Longessaigne (ER), 1 écrasée à St-Maurice/Dargoire (ER). Comptage de 39 sites occupés dans le secteur de Savigny, Bibost, St-Julien/Bibost (groupe Chevêche-ChM).

Chouette hulotte : cris à Ste-Foy-lès-Lyon (GD), chants à Echalas (ER, PA) et aux Ardillats (ER).

Hibou moyen-duc : 1 posé à Jonage le 9 (JB, CeP).

Martin-pêcheur d'Europe : 1 à Miribel-Jonage le 20 (JMB).

Pic épeichette : cris entendus à Monsols le 28 (ER) et Solaize le 19 (VGS), 1 ind. noté à Odenas le 25 (JPR).

Pic noir : cris aux Haies le 16 (PA), à Millery (VGS) et Odenas (JPR) le 25, à Yzeron le 27 et Monsols le 28 (ER), tambourinage à Chênelette le 28 (ER, CdA, PA, MBz), 1 en vol le 22 à Montromant (ER).

Hirondelle rustique : 1 très précoce observée le 24 à Grigny (VGS).

Bergeronnette des ruisseaux : 1 sur les quais du Rhône à Lyon (DT), 1 notée à la Cressonnière de Vaise le 13 (ER), 1 à St-Georges-de-Reneins le 24 (JPR), 1 aux Ardillats le 27 et à Monsols le 28 (ER).

Grive litorne : notée à Chaponost, St-Laurent-d'Agnay (ER) et Cognay (JPR).

Grive mauvis : 1 ind. à Sathonay le 14 (JMB) et une centaine à Vernaison le 16 (VGS).

Roitelet à triple bandeau : 1 noté Monsols le 28 (ER).

Mésange nonnette : signalée à Ste-Foy-lès-Lyon (GD), Yzeron, Monsols et Vaise (ER).

Grand Corbeau : 7 ind. en vol le 27 à Yzeron (ER). On sait qu'un couple a tenté de se reproduire en 2007 dans les Monts du Lyonnais.

Bouvreuil pivoine : signalé à Loire/Rhône (AxR), à Yzeron et aux Ardillats (ER), à Chênelette (ER, PA, CdA, MBz), à St-Didier-sous-Beaujeu (ER, MBz) et à Sathonay (JMB).



Mars 2009

Sarcelle d'été : 10 à Feyzin le 11 (VGS) et 2 à Miribel-Jonage le 12 et le 27 (JMB).

Sarcelle d'hiver : 18 à la Feysine le 22 (DT, LH), 20 à l'Île de la Pape le 23 (ER) et 8 à Miribel-Jonage le 27 (JMB).

A Miribel-Jonage avec toujours beaucoup d'observateurs (JMB, DT, LH, BD, OC, ER, OR, JB, EwT) : 24 **Canards souchets** en retour migratoire le 27, encore 144 **Nettes rousses** le 8 et les premiers couples en parade le 23, 31 **C. chipeaux**, un seul **Fuligule milouin** signalé et encore 71 **F. Morillons** le 8. A noter un **Goéland cendré** et un **Grèbe à cou noir** le 8, 4 **Harles bièvres** le 6 avec encore 1 **Fuligule nyroca** le 13.

Grande Aigrette : un ind. en vol à Miribel-Jonage le 14 (JMB, OC), une posée à Montagny le 22 (JMA) et 2 en vol à Tupin-et-Semons le 25 (CdA).

Aigrette garzette : quelques oiseaux à Grigny (VGS), sans doute de la colonie proche des rives du Rhône aval.

Bihoreau gris : 1 ind. à Anse le 19 (JPR) et à Vernaison le 25 (VGS).

Héron garde-bœufs : 2 signalés à Montagny le 27 (ER), migrateurs ou nicheurs des rives du Rhône ?

Cigogne blanche : 15 migratrices le 10 à Corbas (VGS) et 6 le 11 (NC) et 17 (ER) le 13 à St-Priest. Une encore le 15 à Décines (ER). L'espèce passe dès février et surtout en mars.

Cigogne noire : 1 ind. le 14 à Lentilly (MM, PaM), le 22 à Oingt (OI). 2 à Ternay le 25, 1 à Feyzin le 26 (VGS).

Circaète Jean-le-Blanc : 1 en vol le 25 à Grigny (VGS), le 27 à Soucieu (PF) et en chasse le 30 à Messimy (ER).

Milan noir : le premier migrateur noté le 5 à Grigny (MaD).

Milan royal : 1 le 1^{er} à Genas (PhP), 1 à Montromant le 7 (ER), 1 à Cailloux le 8 (CdA), 1 à Chazay le 10 (MM), 3 aux Haies le 12 (PA), 1 à Fleurieux le 14 (PaM, MM), 1 à Chasselay le 15 (FD), 1 à St-Jean-des-Vignes le 16 (MM), 5 à Ecully le 18 (MaD, NT), 1 le 20 et le 25 à Villefranche (AL), tous sans doute migrateurs de passage.

Autour des palombes : un en vol à Corbas le 14 (VGS) et une femelle posée à Pollionnay le 14 (ER).

Busard des roseaux : un ind. le 14 (JMB, OC) et un le 29 (JMB) à Miribel-Jonage.

Busard St-Martin : nombreuses citations ce mois à St-Laurent-d'Agnay, Theizé, Echallas, Taponas, Frontenas, Colombier-Saugnieu, Genas, St-Priest, Les Haies, Meyzieu, Le Breuil, Pollionnay, Chassagny, St-Maurice/Dargoire, Les Olmes, Messimy (ER, MM, PA, PhP, CdA, PF, AIM, JPR, PaM, GF, MK, NC).

Busard cendré : un ind. en vol à Taluyers dès le 29 (PF).

Balbusard pêcheur : un migrateur le 25 et un autre le 26 à Grigny (VGS), un (le même ?) le 26 à Vernaison (MaD) et un le 27 à Miribel-Jonage (JMB).

Faucon émerillon : 1 ind. posé à Feyzin le 26 (VGS).

Faucon pèlerin : 1 ind. noté à la Croix Rousse le 14 et à la Part-Dieu le 5 (JJ) et le 24 (ER), la couvaison du couple de la raffinerie de Feyzin est confirmée le 18 (JPF, PT, VGS). Une femelle le 8 à Couzon (CdA), la femelle de Villefranche toujours signalée le 9, puis les 19 et 27 (AL) avec une proie identifiée (une Bécasse des bois !).



Rôle d'eau : 1 ind. au Grand Parc de Miribel-Jonage du 5 au 29 (OC, AIM, JMB).

Grue cendrée : belles observations cette année du passage migratoire, souvent plus nocturne, 1 à Bessenay le 11 (AG), 12 le 8 à Condrieu (PA), 45 le 8 à Corbas (VGS), 18 le 12 à Miribel-Jonage (JMB) et 45 le 16 aux Haies (PA).

Oedicnème criard : après la donnée précoce de février, premiers nicheurs signalés à Ste-Consorce (RL, DT, LH, AnC), Lozanne (CdA), Sarcey, Chatillon et Brindas (ER), Soucieu (PF), Chassagny (ER), Chassieu (RC), Genas (PhP, NC), St-Priest (NC), toutes communes où l'espèce est régulière.

Vanneau huppé : beau groupe de 119 à St-Laurent-d'Agnay le 1^{er} (ER), signalé aussi à St-Maurice/D., Chaponost, les Olmes, Corbas, Messimy, Morancé, St-Georges-de-R., Ste-Consorce, Taluyers et Sarcey (ER, MM, VGS, JMA, AnC).

Petit Gravelot : 8 le 21 et 1 les 18, 24 et 29 à Genas (CdA, VaH, NC) en habitat favorable à la reproduction. 3 à la Feyssine le 22 (DT, LH).

Bécasse des bois : une à Chaponnay le 15 (JMB). Une mangée par le F. pèlerin de Villefranche le 19 (AL) !

Bécassine des marais : 3 ind. les 6 & 8 à Miribel-Jonage (JMB).

Chevalier guignette : 1 à Miribel-Jonage le 8 (JMB), 2 le 8 et le 22 à la Feyssine (DT, LH) et 1 le 25 à Lucenay (MM).

Courlis cendré : retours sur les sites de nidification dès le 1^{er} à Taluyers, puis à St-Laurent d'Agnay, Chassagny, St-Georges-de-Reneins, Anse, Pusignan, Colombier-Saugnieu, Corbas (ER, CdA, PhP, VGS, JPR, GF, JMA, PF).

Mouette mélanocéphale : un ind. en plumage H2 le 8 à la Feyssine (DT, LH), espèce soumise à homologation CHR.

Goéland leucophaée : le site de reproduction de Nexans (Lyon 7^è) est visité par 10 adultes le 17, le couple est présent sur son toit (DT). 13 ind. sont à la Feyssine le 22 (DT, LH), signalé aussi à Gerland (CF), sur le Rhône à Lyon (ER, CdA) et à Miribel-Jonage (JMB).

Effraie des clochers : notée à Cailloux et Chassieu (CdA), Echallas et Vourles (ER), Nuelles (ER), mais malheureusement souvent trouvée écrasée, à Fleurieux (ER, EwT), Genas, Bron, Meyzieu, 3 à Jons (PhP), 2 à Frontenas (JPR).

Petit-duc scops : chants à Nuelles le 28 (RR).

Grand-duc d'Europe : nid et couvaison dans les contreforts du Pilat (ER, PA).

Hibou moyen-duc : 1 ind. à Echallas (ER), 1 à St-Loup (PGi) et à Cailloux/Fontaine (CdA), 10 à Parilly (ChP).

Chouette hulotte : chants signalés à Echallas, Miribel-Jonage, Chambost-Allières, la Doua, Yzeron et St-Didier-au-Mont-d'Or (PA, ER, JMB, NR) et des pelotes trouvées à St-Laurent-de-M. et un cadavre à Colombier-Saugnieu (PhP).

Chevêche d'Athéna : signalée surtout dans l'ouest et le sud du département, St-Germain/L'A., Nuelles, Chessy, Chazay, Ste-Consorce, Messimy, Soucieu, Givors, St-Maurice/D., mais aussi à Echallas (ER, DT, MM, NR, LaG, AnC).

Martinet noir : les premiers migrateurs signalés le 26 à Vernaison (MaD).

Martinet à ventre blanc : 1^{ers} retours sur les colonies de Villefranche notés le 17 (AL). Noté aussi à Oingt (OI), Lyon-Vaise (MD, OI), Lyon 5^è (ER, MM).

Martin pêcheur d'Europe : 1 ind. noté le 5 au Rizan (AIM), le 19 à St-Georges (ER), le 26 à Vernaison (MaD) et le 27 à Miribel-Jonage (JMB).

Huppe fasciée : première plutôt précoce dès le 27 à Rillieux (RC) et une le 29 à Genas (CdA, VaH).

Pic épeichette : signalé à Miribel-J., Quincié, les Haies, Chazay, Yzeron, Tupins-et-S. (JMB, JPR, PA, MM, ER, CdA).

Pic noir : cris à Chambost-Allières (ER) et à Quincié (JPR).

Pic mar : 1 ind. aurait été observé à Lacroix-Laval (*fide DT & RR comm. pers.* : OW), obs. à homologuer par une fiche au CHR. L'espèce est très occasionnelle dans le département.

Hirondelle rustique : premières notées le 6 à Miribel-Jonage (JMB).

Hirondelle de fenêtre : les 10 premières le 8 à Villefranche (AL).

Hirondelle de rochers : 1 ind. le 25 à Tarare (ER).

Pipit spioncelle : un ind. le 23 à St-Priest (CF).

Bergeronnette des ruisseaux : signalé à Miribel-Jonage (EwT, JB), à Trêves (ER, PA), au pont de l'Université à Lyon (ER, DT), à St-Georges-de-Reneins (ER), Vernaison (MaD), Vaugneray, Tarare et St-Marcel-l'Éclairé (ER), Ste-Foy-lès-Lyon (GD), 6 ind. le 8 à la Feysine (DT).

Bergeronnette printanière : les 4 premières à la Feysine le 22 (DT, LH), 1 le 24 (NC) et 3 le 29 à Genas (CdA, VaH), 2 à Miribel-Jonage (JMB) le 29 et 1 à Messimy le 30 (ER).

Rougequeue à front blanc : 1 le 30 à Rillieux (JMB) et un couple le 31 à Lozanne (CdA).

Traquet motteux : 1 ind. précoce le 29 à Genas et à St-Priest (CdA, VaH).

Grive litorne : signalée à Echallas, les Haies, St-Maurice/D. (ER, PA, PF), un groupe de 163 à Chaponost le 7 (ER).

Grive mauvis : notée à Chaponnay et Miribel-Jonage (JMB) et aux Haies (ER, PF, PA), jusqu'au 27.



Cisticole des joncs : cris le 7 à Miribel-Jonage (JMB).

Bouscarle de Cetti : 2 à 3 chanteurs retrouvés après ce rude hiver à Miribel-Jonage (JMB, OC).

Pouillot fitis : les premiers le 23 à Vernaison (VGS) et à l'Ile de la Pape (ER). Voir notre article dans *l'Effraie* n°26.

Rémiz penduline : une baguée à Décines le 14 (JMB, OC) et une à St-Priest le 14 (RC).

Pie-grièche grise : de plus en plus rare dans le département (et ailleurs), une à Echallas le 1^{er} (ER, PA), revue le 8.

Grand Corbeau : cris à Montromant le 7 (ER).

Bec-croisé des sapins : cris le 15 à Chambost-Longessaigne (ER).

Bruant proyer : le premier signalé le 12 à Messimy (ER).

Avril 2009

Caille des blés : chanteur noté à Ville/Jarnioux le 13 (OI) et à Soucieu le 20 (PF).

Aigrette garzette : 1 à Solaize le 2 (VGS), Mornant (ER) le 2, et 1 à Anse le 29 (JPR).

Héron garde-bœufs : signalés isolés ou en petits groupes à St-Andéol, Montagny, Chassagny et Taluyers, migrateurs ou nicheurs des rives du Rhône (DT, ER, PDC, PA, GD).

Cigogne noire : 1 ind. en vol migratoire le 5 à Miribel-Jonage (JMB).

Bondrée apivore : traces sur un nid de frelons trouvées à Chaponnay le 4 (BD, JJ).

Milan royal : 1 les 5 & 6 à Fleurieu/Saône (CdA), Taluyers le 6 (DT) et Soucieu le 19 (PF), sans doute migrateurs (?).

Circaète Jean-le-Blanc : 1 en vol le 12 à St-Andéol et le 27 à Trêves (PA), 1 en chasse le 19 à St-Genis-l'Arg. (BD).

Autour des palombes : 1 à Givors le 18 (PaB) et une fem. en vol à St-Genis-l'Argentière le 19 (BD).

Busard des roseaux : un ind. en vol migratoire le 5 (JMB) à Miribel-Jonage et 1 à Genas le 17 (CdA).

Busard St-Martin : nombreuses citations à St-Laurent-d'A., Givors, Trêves, Echallas, St-Andéol, Mornant, Larajasse, Ste-Catherine, St-Jean-de-T., Dardilly, Brullioles, Genas, St-Bonnet-de-Mure, aéroport St-Exupéry, Le Perréon, Ville/Jarnioux, St-Etienne-la-Var., Marennes, Chaponnay (ER, PA, DT, PhP, CdA, PF, JJ, BD, JPR, OI, DTh, MaD, CF).

Busard cendré : signalé dès le 9 en habitat favorable ou en parade à Taluyers, St-Andéol, Chassagny, St-Didier/Riverie, Soucieu, Genas, Le Perréon (ER, PF, DT, LH, PhP, PA, CdA, GD, JPR), tous sites bien prospectés pour l'espèce.

Balbusard pêcheur : un migrateur plutôt précoce le 4 à Cailloux/Fontaine (CdA) et le 8 à Taponas (JPR).

Faucon hobereau : curieusement, une seule citation ce mois d'un ind. à St-Andéol le 12 (PA).

Faucon pèlerin : 1 ind. noté à Lyon 7^e le 4 (AIM, JW), à Lyon 8^e le 15 (OI), éclosion le 15 à la raffinerie de Feyzin (JPF, PT, VGS). Une femelle le 8 à Couzon (CdA), la femelle de Villefranche toujours signalée jusqu'au 25 (AL) avec des proies identifiées (3 Pigeons domestiques, 1 Pigeon ramier et 2 Mouettes rieuses).

Rôle d'eau : 1 ind. semblant territorial à Montagny le 13 (ER).

Oedicnème criard : noté à l'aéroport St-Exupéry (FD), St-Andéol (DT, LH, ER, PDC), St-Laurent-d'Agny (PF, ER), Mornant, St-Maurice/Dargoire et St-Didier/Riverie (ER), Taluyers (OI), Alix (JLL, OI, JdS), Soucieu (PF), Ste-Consorce et St-Genis-les-Ollières (RL, DT et sorties CORA), Lentilly (DT, LH), Sarcey et St-Romain-de-Popey (BD), Genas (CdA, NC), St-Priest (CdA), Frontenas (JPR), Jarnioux et Liergues (XBC), toutes communes où l'espèce est régulière.

Petit Gravelot : 2 le 22 à Morancé où il est probablement nicheur (FD), 4 le 29 à Anse où il niche (JPR). 1 en vol à Montagny le 13 (ER). 4 aussi à Miribel-Jonage le 17 (JMB).

Vanneau huppé : signalé dans les secteurs où il niche, à St-Maurice/D., St-Andéol, St-Laurent-d'A., Taluyers, Mornant, Montagny, Thurins, Chaponost, Lentilly, Chazay, Morancé, Quincieux, Brindas, les Olmes, mais aussi à Larajasse, St-Martin-en-Haut, St-Didier/Riverie, Ste-Catherine (ER, MM, OI, GD, DT, FD, BD).

Courlis cendré : notés sur les sites de nidification, souvent en parade et en couple, à St-Laurent d'Agny, Taluyers, St-Andéol, Montagny, Arnas, Taponas (ER, DT, JPR, GD, PF, PDC, PA).


Chevalier guignette : 1 à la Feyssine (CF) et à Joux le 18 (JPR), 3 à Anse le 29 (JPR) et 2 à Chazay le 30 (MM).

Chevalier culblanc : 2 notés à la Feyssine le 14 (JB).

Chevalier sylvain : 2 au passage à Miribel-Jonage le 17 (JMB).

Chevalier gambette : 1 signalé à la gravière de Joux le 18 (JPR).

Sterne pierregarin : 4 ind. et reproduction attendue (comme en 2007 et 2008) à la Gravière de Joux le 18 (JPR).



Effraie des clochers : encore trouvée écrasée à Simandres (PhP), Irigny (VGS), Anse et Villefranche (OI), on sait que l'espèce paie un lourd tribut à la circulation automobile nocturne. Un poussin mort à Montmelas-St-Sornin (OI).

Grand-duc d'Europe : nid et couvain dans les contreforts des Monts d'Or et dans les Monts d'Yzeron (ER, CdA).

Hibou moyen-duc : nicheur à Ville/Jarnioux (OI), 4 ind. à Parilly (MaD).

Chouette hulotte : chants signalés à Francheville (AGz), à Ste-Foy-lès-L. (GD), 1 observée et un nid à Bessenay (BD).

Chevêche d'Athéna : notée à St-Maurice/D., St-Jean-de-Touslas, St-Didier/Riverie, Mornant, Savigny, Bibost (ER, PF, ChM), à Thurins (AIC), les Chères (FD), prospection CORA les 8 et 9 avec 2 couples à Pollionnay, 4 à Ste-Consorce, 3 à Marcy l'Etoile (DT, BD, MM, JPR, NC, AFe, DS, CF et al.). Un couple bien observé à Pollionnay le 25 (DT & sortie CORA). Comptage d'au moins 54 couples dans le secteur de Bessenay-St-Julien/Bibost-Brullioles (ChM et al.).

Martinet noir : arrivée massive à Lyon les 25 et 26 (DT).

Martinet à ventre blanc : notés sur les colonies de Lyon (VaR, ER, MM, AIM) et de Villefranche (OI). Noté aussi à St-Maurice/Dargoire (DT), Rillieux (JMB), Parilly (OI), Dardilly (MaD), Ste-Foy-lès-Lyon (GD) et Cogny (XBC).

Martin pêcheur d'Europe : 1 à Chassagny le 6 (DT, LH), à Grigny le 5 et à Vernaison le 10 (ER), à Meyzieu le 16 (OI).

Guêpier d'Europe : 6 de ces beaux oiseaux le 27 à Brindas (PaM), 10 à Anse le 29 (JPR).

Huppe fasciée : signalée à Décines le 1^{er} (MaD), à Solaize le 2 (VGS), à Alix le 19 (JLL, OI, JdS), à St-Priest le 18 (NC, CCa) et à Ste-Foy-lès-Lyon (GD).

Torcol fourmilier : cris à Ste-Catherine le 12 (ER) et chanteur entendu à Ste-Paule et St-Laurent-d'Oingt le 13 (OI).

Pic noir : cris ou tambour à Ste-Catherine (ER), Frontenas et St-Forgeux (JPR), Francheville (CF, MCF), Lacroix-Laval (DT), Longes (PA), mâle et cris à Montmelas-St-S. (VH, OC, OI) et Brussieu (BD), aussi à Cogny (XRC) et Messimy (JB).

Hirondelle de rochers : 1 couple à St-Genis-l'Argentière (BD).

Hirondelle de rivage : 2 notées à Irigny le 9 (VGS), colonie reproductrice à Millery (ER) et Anse (JPR).

Pipit des arbres : premiers migrateurs signalés le 1^{er} à Genas (NC).

Pipit spioncelle : 1 le 1^{er} à St-Maurice/Dargoire (ER) et 2 le 6 à St-Andéol (DT).

Pipit rousseline : cris de 3 ind. le 13 à Chassagny (ER).

Bergeronnette printanière : quelques citations de nicheurs probables à Genas (PhP, CdA), St-Priest (NC), Miribel-Jonage (JMB), St-Maurice/Dargoire (ER), Brussieu (BD), Frontenas et Arnas (JPR).

Rossignol philomèle : premier chant le 2 à Solaize (VGS).

Rougequeue à front blanc : alarmes d'un ind. très précoce le 5 à Bessenay (BD), mâle noté à Lacroix-Laval dès le 9 (DT), à St-Georges-de-Reneins les 9 & 12 (ER, OI), Oullins le 11 (JJ, BD), St-Julien/Bibost le 13 (BD), Thurins le 18 (AIC), noté aussi à Ste-Foy-lès-Lyon (GD), Bessenay, Sain-Bel, St-Romain-de-Popey, Brussieu et Charbonnières (BD).
Tarier des prés : premier migrateur signalé le 4 à Genas (PhP).

Cisticole des joncs : 1 couple à Taluyers le 2 (ER).

Bouscarle de Cetti : 1 ind. baguée à Miribel-Jonage le 5 (JMB).

Locustelle tachetée : chants entendus à Miribel-Jonage le 5 (JMB), au marais de Boitray le 9 (ER), à Echalas le 25 et Trêves le 27 (PA) et Ste-Foy-lès-Lyon le 25 (GD).

Rousserolle effarvatte : 2 chanteurs à Miribel-Jon. le 17 (JMB) et St-Priest le 18 (NC, EIB), 1 à Brussieu le 19 (BD).

Fauvette passerinette : exceptionnelle obs. d'un ind. dans le Haut-Beaujolais le 11 (JMB).

Fauvette mélanocéphale : remarquables citations de 2 chanteurs à Montagny le 13 (ER) qui confirment l'implantation de l'espèce sur les landes du secteur depuis 2000.

Fauvette des jardins : rarement citée, 1 à St-Laurent-d'Agnay le 4 (ER) et 1 chanteur à St-Georges-de-R. le 12 (OI).

Pouillot de Bonelli : chanteur à Miribel-Jonage le 16 (OI) en halte migratoire.

Pouillot siffleur : rarement cité, 1 ind. (en halte migratoire) à Ste-Foy-lès-Lyon les 3 & 4 (GD).

Roitelet à triple bandeau : 1 à Gerland le 3 (JB).

Gobemouche noir : 1 à Irigny le 18 (JB) et à Ste-Foy-lès-Lyon le 27 (VH).

Grimpereau des bois : 2 ind. à St-Igny-de-Vers (JMB).

Rémiz penduline : 2 baguées à Décines le 5 (JMB).

Bruant ortolan : 2 ind. le 17, puis 5 et 8 le 19 à Genas (CdA), migrateurs probables.

Bruant proyer : 1 ind. signalé le 11 à St-Laurent-d'Agnay (ER).



Mai 2009

Tadorne de Belon : 1 ind. le 8 à Miribel-Jonage (JMB).

Caille des blés : nombreux chants entendus ce mois pour cette espèce à reproduction très irrégulière, 1 chanteur noté à Chaussan le 1^{er} (ER), 1 à St-Laurent-d'Agnay le 3 (GD) et 2 le 21 (ER), 8 à Feyzin le 15 (VGS), 3 à Genas le 16 (PhP), 1 à Longessaigne et 1 à St-Laurent-de-Chamousset le 23 (ER), 1 à St-Laurent-de-Mure le 24 (PhP).

Aigrette garzette : 7 signalées aux Arboras (ER) et 5 à Miribel-Jonage (JMB) début mai.

Bihoreau gris : 1 ind. signalé à Miribel-Jonage (JMB) le 9, à St-Georges-de-Reneins le 20 (ER), à Chénelette (NC) le 24, à Chassagny le 28 (CF) et le 30 (DT), à la feyssine le 25 (JB),

Héron garde-bœufs : 2 observés à St-Jean-d'Ardières le 1^{er} (JPR), signalés isolés ou en petits groupes à St-Andéol, Montagny, Chassagny et Taluyers, migrateurs ou nicheurs des rives du Rhône (DT, ER, AIB, GD).

Blongios nain : un mâle le 25 à Miribel-Jonage (CdA).

Cigogne blanche : 1 ind. en vol migratoire le 10 à Quincieux (LG).

Cigogne noire : 1 ind. en vol à Charbonnières le 9 (AnC).

Bondrée apivore : migrateurs signalés du 1^{er} au 15 isolés ou en groupe jusqu'à 25 oiseaux (MM, OI, XBC, ER CdA, JMB, LG), parades notées à Quincié (ER) le 31.

Milan royal : 1 ind. en vol le 9 à Charbonnières (AnC) et le 25 à Chénelette (NC).

Circaète Jean-le-Blanc : 2 en vol à Chassagny (GD) et 1 (même oiseau ?) à St-Andéol (ER) le 1^{er}, 1 à Beaujeu le 6 (CdA), 1 à St-Laurent-d'Agnay le 22, à St-Maurice/Dargoire le 28 et 1 à Odenas le 31 (ER).

Autour des palombes : 1 à Courzieu le 9 (MM).

Vautour fauve : un ind. en vol le 17 à St-Romain-de-Popey (BD), 5 le même jour sur le nord-beaujolais (JMB).

Vautour moine : **première obs. départementale**, un oiseau en vol le 17 à St-Romain-de-Popey (BD). Voir notre article dans l'Effraie n°27.

Busard des roseaux : un ind. en vol migratoire le 11 à Cailloux (CdA) et le 15 à Feyzin (VGS).

Busard St-Martin : nombreuses citations à Messimy, St-Laurent-d'A., St-Andéol, St-Laurent-d'Agnay, Ste-Catherine, St-Didier-sous-Riverie, St-Maurice/Dargoire, Genas, aéroport St-Exupéry, Quincié et Feyzin (ER, VGS, DTh, GD, FaD, DT, PhP, CdA), sites où l'espèce peut éventuellement nicher.

Busard cendré : de 1 à 6 oiseaux signalés près des communes où l'espèce est nicheuse régulière, en petit nombre, (DT, ER, PhP, NR, AxR, XBC, MiG) et 1 en vol à Beaujeu le 6 (CdA).

Faucon hobereau : de 1 à 4 ind. tout le mois au Grand Large, à Miribel-Jonage, Quincié, St-Etienne-la-Varenne, Avenas, Beaujeu (JMB, XBC, ER, CdA).

Faucon pèlerin : 1 ind. noté à Feyzin le 15 (VGS). 2 poussins observés le 13 à la raffinerie (fide VGS).

Faucon kobez : une fem. le 9 à Charbonnières (AnC).

Oedicnème criard : noté à St-Andéol (DT, LH), Chassagny et St-Laurent-d'Agny (GD), Mornant et St-Didier/Riverie (ER), Ste-Consorte (DT), Lentilly (DT, LH, BeV) et Lozanne (DT, LH), Feyzin (VGS), Genas (PhP, NC), St-Laurent-de-Mure (PhP), St-Georges-de-Reneins (CIR), les Chères (LG), Jarnioux (XBC), toutes communes où l'espèce est régulière.

Petit Gravelot : jusqu'à 6 ind. à Anse (JPR), 3 à la Feysine le 2 (DT, LH), 1 à Arnas les 12 & 15 (JPR) et 1 à St-Georges-de-Reneins le 20 (ER).

Vanneau huppé : signalé dans les secteurs où il niche, St-Andéol, Taluyers, Chassagny, Mornant, Thurins, Lentilly, Morancé, St-Georges, Brindas, mais aussi à Larajasse, St-Martin-en-Haut, Ste-Catherine et Feyzin (ER, VGS, CIR, GD, DT, LH, MM, AIB).

Echasse blanche : remarquable obs. de 2 oiseaux au Grand Large le 9 (JMB).

Bécasse des bois : 2 ind. notés à Avenas le 30 (ER).

Courlis cendré : de 1 à 3 oiseaux notés sur les sites de nidification, à St-Laurent d'Agny, Taluyers, St-Andéol, St-Georges-de-Reneins, Genas (ER, DT, JPR, GD, PhP).

Chevalier guignette : signalé à Anse, Arnas (JPR), la Feysine (DT, LH) et à Miribel-Jonage (JMB), sites où il est régulier, mais toujours pas d'indice de reproduction.

Chevalier gambette : 1 signalé à la gravière de Joux le 1er (JPR) et 4 posés ensemble à la Feysine le 2 (DT, LH).

Chevalier aboyeur : 5 notés à Miribel-Jonage le 8 (JMB).

Combattant varié : 1 au Grand Large le 10 (JMB).

Goéland brun : un ind. à Miribel-Jonage le 8 (JMB).

Goéland leucophaée : 3 poussins le 22 à Lyon 7^e (DT). Voir notre rubrique dans l'Effraie n°27.

Mouette pygmée : 2 oiseaux au Grand Large le 9 (JMB).



Sterne pierregarin : 4 ind. et reproduction (comme en 2007 et 2008) à la Gravière de Joux (JPR). 2 couples aussi à Miribel-Jonage (JMB). Voir notre rubrique INFO ORNITHO dans l'Effraie n°27.

Guifette moustac : 5 oiseaux passent au Grand Large le 8 (JMB).

Guifette noire : de 11 à 53 ind. notés au Grand Large et à Miribel-Jonage du 8 au 23 (JMB, JB).

Grand-duc d'Europe : juvéniles observés le 2, le 3 et le 22 dans les monts de l'ouest du département (ER).

Hibou moyen-duc : un ind. retrouvé mort à Mornant (ER) et aussi à Feyzin (VGS), 1 en vol le 28 à Mornant (ER).

Chouette hulotte : chants signalés à Craponne (AGz), à Cogny (XBC), à Chaussan (ER), juvéniles volants à Bourg-de-Thizy le 3 et à St-Maurice/Dargoire le 28 (ER).

Chevêche d'Athéna : notée à St-Maurice/D., St-Jean-de-T., St-Didier/Riv., Mornant, St-Laurent-d'Agny, Soucieu, Brindas, Pollionnay, Tassin, Feyzin, St-Bonnet-de-M., Ville/Jarnioux, Cogny (PhP, GD, DT, LH, XBC, ER, FaD, VGS).

Engoulevent d'Europe : chant noté à Cogny le 21 (XBC), à Echallas le 16 (ER), à St-Cyr/Rhône le 23 (JJ), parade à Chassagny le 18 (ER).

Martinet à ventre blanc : qq. ind. à Parilly (OI), St-Maurice/D. (AIB), Perréon (DiR), Lyon (NR, ER), à Messimy (ER).

Martin pêcheur d'Europe : 1 ind. à Miribel-Jonage le 10 (JMB) et 2 le 30 à Chassagny (DT).

Guêpier d'Europe : de 3 à 12 oiseaux sur les sites de reproduction à Anse (JPR), à Miribel-Jonage (JMB). Noté aussi en vol migratoire à St-Laurent-d'Agny le 21 et St-Andéol le 1^{er} (ER).

Huppe fasciée : 1 ind. noté à Pollionnay (MM), Brindas et Soucieu (GD), 4 à St-Jacques-des-Arrêts (JMB).

Pic noir : noté à Monsols et Taluyers (ER), à Ste-Foy-lès-Lyon (GD).

Hirondelle de rochers : 2 à Valsonne le 4 (ER), 3 à St-Marcel-l'Eclairé le 14 (CdA) où 2 sont vus aussi le 18 et 8 le 26 (ER), 2 à Rivolet le 28 (CdA).

Hirondelle de rivage : une trentaine début mai à Anse (JPR).

Bergeronnette printanière : quelques citations de nicheurs probables tout le mois à Cailloux (CdA), Genas (PhP, CdA), Feyzin (VGS), Miribel-Jonage (JMB), St-Georges-de-Reneins (ER), Chénelette (NC) et Arnas (JPR).

Rougequeue à front blanc : noté à Ecully, Vénissieux, Soucieu, Rillieux, Lyon, Francheville, St-Marcel-l'Eclairé, St-Georges, Cailloux (CdA, HP, OI, CF, JMB, DT, ER, EPR)

Tarier des prés : noté un peu partout du 1^{er} au 18 (DT, GD, PhP, MM, VGS, JMB).

Traquet motteux : migrateurs encore notés du 3 au 16 (GD, PhP, MM, ER).

Bouscarle de Cetti : 2 chanteurs à Miribel-Jonage le 10 (JMB).

Locustelle luscinoïde : un chanteur le 21 (BDG) à St-Maurice/Dargoire (probablement en halte migr.).

Locustelle tachetée : chants entendus St-Andéol et Messimy le 1^{er} (ER) et à Condrieu le 6 (PA).

Rousserolle effarvatte : 1 chanteur à Anse le 1^{er} (JPR), 4 chanteurs au Grand Large le 10 et 5 à Miribel-Jonage (JMB), un chanteur le 30 à Chassagny (DT).

Rousserolle turdoïde : 2 chanteurs à Miribel-Jonage le 15 (JMB).

Fauvette babillarde : rarement citée, 1 ind. le 12 à Belleville (JB).

Fauvette des jardins : rarement citée, 1 à La Doua le 12 (NR), 1 à Chassagny le 18 (ER), 1 à Ste-Catherine le 23 (ER) et 1 ind. à St-Genis-Laval le 27 (JB).

Pouillot de Bonelli : 1 à Chaussan le 1^{er} et 1 à St-Didier-sous-Riverie le 3 (ER), migrateurs (?).

Pouillot siffleur : rarement cité, 1 ind. (en halte migratoire ?) à St-Maurice/Dargoire (BDG).

Gobemouche gris : un chanteur à Miribel-Jonage (JMB) le 10 et à Belleville le 12 (JB).

Gobemouche noir : 1 à Chazay le 12 (MM) et 1 à St-Maurice/Dargoire le 19 (AIB).

Cinle plongeur : rarement cité dans nos chroniques, un oiseau vu à St-Maurice/D. le 24 (ER).

Beccroisé des sapins : un groupe de 36 en vol à Chiroubles le 31 (ER).

Bouvreuil pivoine : quelques oiseaux notés à St-Cyr-le-Chatoux (XBC), Avenas et Chiroubles (ER), nicheurs possibles.

Juin 2009

Caille des blés : chant à Arnas le 21 (FLD), à St-Martin-de-Cornas (ER) et Ville/Jarnioux le 27 (XBC).

Grèbe castagneux : reproduction signalée à Millery (ER).

Blongios nain : un mâle le 12 à Miribel-Jonage (JMB), sans doute le même que celui noté en juin et probablement nicheur.

Bihoreau gris : 1 ind. signalé à Miribel-Jonage (JMB) le 7, 1 en vol à St-Didier-sous-Riverie le 9 (CF).

Héron garde-bœufs : de 1 à 13 à St-Andéol tout juin (GD, ER).

Aigrette garzette : 1 à St-Jean-la-Bussière le 3, 1 à Millery le 8 et 1 à l'Ile de la Chèvre le 16 (ER).

Héron pourpré : 1 à Miribel-Jonage le 12 (JMB).

Cigogne noire : 5 ind. en vol à Millery le 12, date vraiment tardive pour la migration ???? (ER).

Milan royal : 1 ind. en vol le 5 à Valsonne (ER), le 7 à St-Romain-en-Gal (PA) et le 20 à Ranchal (CF), malheureusement sans preuve de nidification.

Vautour fauve : deux oiseaux en vol le 25 à Rivolet (CdA).

Vautour moine : un ind. en vol le 17 à Millery (ER), remarquable après la 1^e obs. départementale de mai à St-Romain-de-Popey (BD) ! Voir notre article dans l'Effraie n°27.

Circaète Jean-le-Blanc : couples et parades à Chamelet (JPR), Cogny (XBC), Jullié (JMB) et Quincié (ER, PF, CdA).

Busard St-Martin : noté à Ste-Catherine, St-Martin-en-Haut, St-Just-d'Avray, Létra, Ste-Paule, St-Cyr-le-Chatoux, aéroport St-Exupéry, Les Haies et Trades (ER, PDC, PF, JMB, CdA), avec quelques données de nidification.


Busard cendré : quelques couples signalés près des communes où l'espèce est nicheuse régulière, en petit nombre, (JB, GD, AxR) et 1 en vol à St-Maurice le 4 (ER).

Faucon hobereau : noté au Grand Large, à St-Jean-la-Bussière, Létra, St-Maurice/D. et Chaponost (JMB, ER, CdA).

Faucon pèlerin : 1 ind. noté à Condrieu le 9 (NC, JB), à Vénissieux ville le 19 (MaD) et aux Sauvages le 4 (ER).

Echasse blanche : remarquable obs. de 2 oiseaux au Grand Large le 9 (JMB).

Oedicnème criard : 2 ind. à la gravière de Joux pourraient constituer le premier couple noté en bord de fleuve dans le département (FLD). Noté aussi Chazay (MM, DS), à Soucieu (GD), St-Andéol et St-Maurice/Dargoire avec poussins (ER), Pollionnay (DT, MM), Ste-Consorte (DT), Genas (CdA) et St-Laurent-de-Mure (PhP).



Petit Gravelot : 2 couples avec juv. à la gravière de Joux (JPR, FLD *et al.*) et 2 ind. à St-Georges-de-Reneins (JPR). 4 couples aussi avec poussins à Miribel-Jonage (JMB).

Vanneau huppé : signalé dans les secteurs où il niche, Morancé, St-Georges, Brindas, mais aussi à Larajasse avec un groupe de 21 le 21 (ER, GD, DS, MM, JPR).

Bécasse des bois : 2 ind. notés à Vauxrenard le 2 et à Ouroux le 4 avec chants (JMB), entendue le 4 à Dareizé et vue en vol le 16 aux Haies (ER).

Courlis cendré : de 1 à 6 notés sur les sites de nidification, à Arnas, Genas et St-Exupéry (JPR, PhP, CdA, PF, PDC).

Chevalier culblanc : 3 ind. le 6 (JPR), 2 en vol le 24 (ER) à Joux et 2 à Miribel-Jonage le 27 (JMB).

Sterne pierregarin : 4 ind. et reproduction avec au moins 5 juv. à la Gravière de Joux (JPR, FLD), 2 couples aussi avec poussins à Miribel-Jonage (JMB). Voir notre rubrique *INFO ORNITHO* dans *l'Effraie n°27*.

Guifette moustac : 3 oiseaux passent au Grand Large le 9 (JMB).

Guifette noire : 1 adulte curieusement présent plusieurs jours fin juin à la gravière de Joux (FLD, JPR).

Effraie des clochers : signalée seulement à Propières (JMB) et Cogny (XBC).

Petit-duc scops : chanteur à Ouroux (JMB) et à Cogny (XBC).

Chevêche d'Athéna : notée à Ouroux, Vauxrenard et Trades (JMB), Ville/Jarnioux, Cogny et Gleizé (XBC), Chazay (MM), Ste-Consorce, Pollionnay et Tassin (DT, MM), St-Maurice/D., St-Andéol, Givors, Chaponost, Arnas (ER, CdA), Limonest (RF). Les secteurs occupés par l'espèce semblent plus nombreux que prévu !

Chouette hulotte : chants signalés à Ouroux, St-Jean-la-Bussière, Francheville, Ste-Foy-lès-Lyon, St-Just-d'Avray, Dareizé, Givors (avec jeunes), Les Haies et St-Genis-Laval (ER, JMB, AGz, GD, CdA).

Hibou moyen-duc : juvéniles observés à Parilly (MaD) et Chassagny (ER, CdA).

Engoulevent d'Europe : chant noté à Ouroux et Tardes (JMB), Montmelas-St-Sornin, St-Cyr-le-Chatoux et Ville/Jarnioux (XBC), et aux Haies (ER). L'espèce est de plus en plus souvent citée.

Martinet à ventre blanc : de 4 à 30 oiseaux sur les colonies lyonnaises (VaR, GB), noté aussi à Condrieu (VGS), Ecully (HP), St-Maurice (ER, CdA, PF), Caluire (BR).

Martin pêcheur d'Europe : seulement 2 notés à Condrieu (NC, JB) et 1 à l'Ile de la Chèvre (ER).

Guêpier d'Europe : seulement 6 ind. notés, à Condrieu le 9 (NC, JB).

Huppe fasciée : 1 ind. noté aux Ardillats le 1^{er} (ER), à Soucieu le 2 (JB), à Ste-Foy-lès-Lyon le 9 (GD), à St-Etienne-la-Varenne le 14 (ER, PF), aux Haies (ER, PDC) et à Ste-Consorce (DT, AGz) le 27.

Pic noir : noté surtout dans les monts de l'ouest du département, Chamelet, Ranchal, Létra, Amplepuis, Valsonne et Ste-Catherine, qui doivent présenter les meilleures densités (JPR, CF, ER, CdA).

Torcol fourmilier : enfin des indices de reproduction, chants à Ouroux le 4 (JMB) et à Valsonne le 5 (ER).

Hirondelle de rochers : nidification observée à Courzieu, Tarare et St-Marcel-l'Eclairé (ER, JMB) avec de 2 à 15 ind..

Hirondelle de rivage : deux colonies à Millery avec plus de 50 et 100 oiseaux (ER), 2 ind. notés à Genas le 7 (CdA).

Pipit des arbres : rarement cité hors passage migratoire, chanteurs et indices de reproduction à Poule-les-Echarmeaux, Ranchal, Létra, Les Sauvages, St-Cyr-le-Chatoux (avec jeunes), Ste-Paule, Ouroux, mais aussi à Beaujeu, St-Etienne-la-Varenne, Longes (CF, PA, ER, CdA, PF, JMB).

Bergeronnette printanière : quelques citations de nicheurs à Quincieux (LG), Arnas (JPR, ER), Colombier-Saugnieu et Genas (CdA).

Rousserolle turdoïde : 2 chanteurs à Miribel-Jonage le 12 (JMB).

Fauvette des jardins : chanteur signalé à Ste-Catherine, Ste-Paule, Chiroubles (ER, PF, CdA), St-Christophe (JMB), Beaujeu et Limonest (CdA, MBz, ER). L'espèce est discrète et rarement notée autant !

Pouillot de Bonelli : un mâle chanteur le 6 aux Haies (ER) peut laisser penser à une repro. possible à cette date (?).

Pouillot siffleur : même remarque pour un mâle à Trades le 3 (JMB).

Gobemouche gris : juvéniles observés à St-Christophe début juin (JMB).

Grand Corbeau : 3 ind. à St-Cyr-le-Chatoux le 24 (ER) et 6 à Longes le 28 (PA).

Beccroisé des sapins : cris entendus le 28 à Longes (PA).

Bruant fou : nicheurs avec jeunes notés à Vauxrenard (JMB), chanteurs à Quincié, Chiroubles, Beaujeu et Avenas (ER, CdA, MBz, PF, MxM).

Bruant proyer : cité à St-Laurent-de-Mure, Soucieu, les Ardillats, Chambost-Allières, Beaujeu, Genas et aéroport de St-Ex. (CdA, MxM, PF, PDC, ER, PhP, GD).

Juillet 2008

Moins d'observations que d'habitude en juillet, car surtout moins d'observateurs ! A noter les nichées d'anatidés à Miribel-Jonage, **Nettes rousses**, **Canards chipeaux** et **colverts**, mais aussi celles des **Grèbes huppés**, ainsi que la présence estivale de 2 **Fuligules milouins** et d'un **F. morillon** et déjà 900 **Foulques macroules** le 4 (JMB).

Bihoreau gris : 2 ad. le 4 et 3 ind. signalés à Miribel-Jonage le 31 (JMB).

Héron garde-bœufs : 3 à Chassagny le 11 (GD) et 13 à St-Andéol le 21 (ER).

Héron pourpré : 1 ad. et 1 juv. le 31 à Miribel-Jonage où l'espèce niche depuis quelques années seulement (JMB).

Bondrée apivore : couple aux Haies le 4 (ER, PDC), à Ste-Catherine le 20 (ER), 2 ind. à Propières le 17 (RC) et 1 ind. à Rivolet le 22 (CdA).

Vautour fauve : 7 oiseaux en vol le 2 à Beaujeu (M. BOJARD ONF fide ER).

Circaète Jean-le-Blanc : 1 à Messimy le 5 (ER, PDC), 1 à Riverie le 7 et à Millery et Montagny le 9 (ER), 1 à Cenves le 18 (ER, CdA, PF), 2 à Trades le 23 (CMA) et 1 à Lyon le 29 (SC).

Busard St-Martin : 1 aux Haies le 4 (ER, PDC), 2 à St-Andéol le 11 (GD), 1 à St-Clément-les-Places le 14 et le 15 (ChV), 1 juv. à Soucieu le 30 et 2 à Rontalon le 31 (ER).

Busard cendré : 1 à St-Laurent-d'Agnay le 3 (ER), 1 aux Haies le 4 (ER, PDC), 1 à St-Jean-des-Vignes le 31 (MM).

Faucon hobereau : 4 poussins au nid à Miribel-J. le 4 (JMB), 1 ind. aux Haies le 4 (ER, PDC) et Rivolet le 22 (CdA).

Oedicnème criard : noté à Lacenas (XBC), Mornant (CdA), St-Jean-des-Vignes (MM), St-Exupéry (FaB), Soucieu (ER), petit groupe de 5 à Brindas le 21 (LaM) et un groupe de 8 à Charentay le 21 (CIR).

Petit Gravelot : 1 ind. à la gravière de Joux (JPR, CdA).

Vanneau huppé : un groupe de 16 le 11 à Ste-Catherine (ER).

Courlis cendré : un juv. le 9 à Mornant (CdA).

Chevalier guignette : 13 (migrateurs) au Grand Large et 5 à Miribel-Jonage le 31 (JMB).

Sterne pierregarin : 6 ind. dont juv. volants à la gravière de Joux (JPR, CdA). 4 en vol au Grand Large et nourrissage de 2 poussins sur chaque radeau à Miribel-Jonage le 31 (JMB). Voir notre rubrique **INFO ORNITHO** dans *l'Effraie* n°27.

Guifette noire : 23 ind. en chasse au Grand Large le 31 (JMB).

Petit-duc scops : 1 ind. noté à Cogny le 12 (XBC).

Chevêche d'Athéna : notée à Cogny et Blacé avec juv. (XBC), un juv. volant à Pommiers (XBC), juv. à St-Maurice/D. (ER), signalée à Rivolet, Mornant, St-Laurent-d'Agnay et St-Georges-de-R. (CdA, ER, XBC, ChV, CIR).

Chouette hulotte : chant signalé à St-Clément-les-Places le 14 (ChV), cris à Soucieu le 30 (ER).

Engoulevent d'Europe : 1 à Rivolet le 12 et à Blacé le 13 (XBC). Chants le 30 à Soucieu (ER).

Martinet à ventre blanc : 15 ind. à Vaugneray le 17 (LaM), 13 ind. le 21 à Vaugneray (ER), 4 ind. à St-Cyr-le-Chatoux le 25 (XBC), 1 à Soucieu le 26 (CdA).

Martin pêcheur d'Europe : seulement un ind. noté au Grand Large le 31 (JMB).

Guêpier d'Europe : 19 ind. dont juv. notés à Miribel-Jonage le 31 (JMB).

Huppe fasciée : signalée aux Haies, la Tour-de-Salvagny, Vaugneray, St-Maurice/Darg., St-Andéol, Messimy, Trades (PA, PDC, SC, ER, LaM, CMA).

Pic épeichette : 1 à Chazay le 26 (MM).

Pic noir : noté à Lentilly, Chaponnay, St-Clément-les-Places et Limonest (RF, ChV, PeV).

Hirondelle de rivage : centaine à St-Exupéry le 15 (FaB). 20 ind. et nourrissage de juv. le 31 à Miribel-Jonage (JMB).

Pipit des arbres : rarement cité hors passage migratoire, chanteur signalé à St-Clément-les-Places (ChV).

Bergeronnette printanière : une seule signalée à la gravière de Joux le 2 (JPR, CdA).

Rougequeue à front blanc : nourrissage de juv. à Gerland (JMB). 1 chanteur à Azolette le 18 (RC).

Gobemouche noir : premier migrateur très précoce le 24 à Limonest (RF).

Pie-grièche écorcheur : noté à Chassagny, St-Andéol, Ste-Catherine, Montmelas-St-Sornin, St-Cyr-le-Ch., Morancé, St-Clément-les-P., Larajasse, Ouroux, Propières, Azolette, souvent avec juv. (GD, XBC, MM, ChV, PF, ER, RC).

Bruant des roseaux : curieuse obs. d'un ind. en vol le 11 à Larajasse (ER).

Bruant proyer : 7 notés à Genas le 16 (PhP).



août 2009

Sarcelle d'été : une à Miribel-Jonage du 14 au 28 au moins (JMB).

Sarcelle d'hiver : les premières dès le 14 à Miribel-Jonage (JMB).

Blongios nain : remarquable et encourageante reproduction d'un couple avec 2 juv. à Miribel-Jonage le 7 (JMB, BD).

Bihoreau gris : 1 à Dracé le 6 (CF), 4 le 8 à Chassagny (ER), 1 à Miribel-Jonage le 8 (BD) et 2 à Irigny le 10 (VGS).

Héron garde-bœufs : 2 à Miribel-Jonage le 7 (JMB), 9 à Montagny le 3 (ER) et 80 à Dracé le 6 (CF).

Aigrette garzette : 2 ind. à Miribel-Jonage tout le mois (BD, JMB) et 1 signalée à l'Ile du Beurre le 14 (DS).

Grande Aigrette : 2 à Grigny le 21 (VGS).

Héron pourpré : présence inhabituelle d'un oiseau (en halte migratoire) à Lentilly le 25 (DT, LH). 2 juv. le 8 à Miribel-Jonage où l'espèce niche (BD, JMB).

Cigogne blanche : belles obs. de migrants, 63 le 24 et 94 le 26 à Corbas (VGS), 9 à Miribel-Jonage le 28 (JMB) et 6 à Vénissieux le 31 (CF).

Cigogne noire : belle obs. d'un oiseau le 20 à Lyon (BTh) et 1 à St-Julien/Bibost le 30 (ChM).

Bondrée apivore : notée dans les Monts du Lyonnais et du Beaujolais, ainsi qu'à Grigny et Thurins, nicheurs probables et juv. volants (ER, JGC, LR, VGS, BD).

Busard St-Martin : 1 mâle le 30 à Chassagny (DT).

Busard cendré : 1 ind. noté à Genas le 2 (JMB) et le 8 à Chassagny (ER), 3 couples avec juv. à Ste-Catherine (ER).

Balbusard pêcheur : 1 ind. à Miribel-Jonage le 7, 1 à Lyon le 23 (JuM), 1 au Miribel-Jonage et 1 (le même ?) au Grand Large le 28 (JMB), 1 au Grand Large le 30 (CF).



Faucon hobereau : signalé à Miribel-Jonage, Grand Large, Montagny, Soucieu, Ste-Catherine, Vernaison, Haute-Rivoire, Ranchal (JMB, ER, VGS, JJ) ; juv. volants à Dracé (CF) et Genas (JMB).

Faucon pèlerin : 1 à Soucieu le 9, 1 à Villefranche le 18 (AL) et 1 en vol à Genay le 20 (VGS).

Avocette élégante : encore une remarquable obs. à Miribel-Jonage le 14 (JMB).

Oedicnème criard : noté à Soucieu (ER, MBz), St-Andéol (ER), Genas (JMB) avec juv., Chazay (MM, DS), petits groupes de 5 à Chassagny le 26 (ER, PF), de 10 à Ste-Consorte le 25 (DT, LH), rassemblements de 55 à Lentilly le 25 (DT, LH) et de 22 au désormais célèbre site de St-Priest (CF) en attendant plus en septembre-octobre.

Petit Gravelot : de 1 à 5 ind. (nicheurs) à Miribel-Jonage (JMB).

Grand Gravelot : 2 à Miribel-Jonage le 7 et 1 le 14 (JMB), 2 à Grigny le 21 (VGS).

Pluvier argenté : remarquable obs. (5^e donnée dép.) d'un oiseau en plumage d'été à Miribel-Jonage le 20 (JMB).

Vanneau huppé : petits groupes de 6 à 43 tout le mois à Genas, Ste-Catherine, Chazay, St-Andéol, Miribel-Jonage (BD, ER, JMB, MM, DS) et ind. isolés à Dracé (CF), St-Andéol (DT, ER) (sans doute des nicheurs locaux) et Miribel-Jonage (JMB).

Bécasseau minute : de 1 à 2 migrants à Miribel-Jonage du 7 au 28 (JMB).

Bécasseau variable : de 2 à 5 migrants du 7 au 14 à Miribel-Jonage (JMB).

Bécassine des marais : jusqu'à 11 ind. à Miribel-Jonage (BD, JMB).

Chevalier aboyeur : de 1 à 5 migrants à Miribel-Jonage du 7 au 14 (JMB).

Chevalier culblanc : 1 à St-Andéol le 3 et Taluyers le 8, 1 à Millery le 17 (ER), 2 à Miribel-Jonage les 14 & 20 (JMB).

Chevalier sylvain : à Miribel-Jonage, 3 le 8, 8 les 14 & 20 et 1 le 28 (BD, JMB).

Chevalier guignette : de 1 à 5 au Grand Large, de 2 à 12 à Miribel-Jonage (JMB, CF). 4 à Dracé le 6 (CF) et 2 à la Feyssine le 29 (DT, LH).

Sterne caspienne : exceptionnelle donnée (4^e départementale) de 2 ind. en chasse à Miribel-Jonage le 20 (JMB), le même jour où 3 étaient vues à l'Ecopôle du Forez (A. FAURE in ornithomedia.com) !

Sterne pierregarin : 7 ind. dont juv. volants, et encore une le 28, à Miribel-Jonage (JMB, BD). Voir notre rubrique INFO ORNITHO dans l'Effraie n°27.

Guifette noire : 5 ind. en chasse au Grand Large le 14 et 4 le 28 (JMB).

Guifette moustac : 1 à Miribel-Jonage le 8 (BD) et 2 au Grand Large le 14 (JMB).

Effraie des clochers : nid à Mardore (ER), 1 ind. noté à Brindas (ER) et 1 à Haute-Rivoire (JJ).

Hibou moyen-duc : plume trouvée le 23 à St-Laurent-de-Mure (PhP).

Chevêche d'Athéna : notée à Taluyers, Soucieu, Thurins et Haute-Rivoire (YB, TB, ER, JJ).

Chouette hulotte : chants signalés à Villeurbanne, Lyon, Ste-Foy-lès-Lyon, Soucieu, St-Marcel-l'Éclairé, Yzeron, Meaux-la-Montagne, St-Bonnet-des-Bruyères. Couples à Aveize, St-Martin-en-Haut, St-Igny-de-Vers, juv. volants à Soucieu (ER, MP, NR, MaD, JGC, LR, MBz, CdA, GD).

Engoulevent d'Europe : citations plus nombreuses que d'habitude de nicheurs probables à Ste-Catherine, St-Andéol, Montagny, Taluyers, Messimy, Soucieu, Yzeron, Ranchal, St-Bonnet-des-Bruy., St-Igny-de-V. (ER, CdA, MBz, JGC).

Martinet à ventre blanc : signalé à Ste-Foy-lès-Lyon, Rillieux, Feyzin (JLB, VGS, GD).

Martin pêcheur d'Europe : signalé à Montagny, Chassagny, Taluyers, Grand Large et Miribel-Jonage, la Feysine, Ile du Beurre (DT, LH, ER, JMB, DS).

Guêpier d'Europe : 58 ad. et juv. à Miribel-Jonage le 14 (JMB, BD).

Huppe fasciée : une seule signalée le 30 à Messimy (ER).

Pic épeichette : 1 à Haute-Rivoire le 7 (JJ).

Pic noir : noté à Aveize, St-Martin-en-Haut, Yzeron, St-Bonnet-des-Bruyères, Cours-la-Ville, Haute-Rivoire, Ste-Foy-lès-Lyon (ER, JGC, LR, MBz, CdA, JJ, GD).

Hirondelle de rivage : une centaine au Grand Large le 28 (JMB).

Hirondelle de rochers : 4 à Tarare, 8 à St-Bonnet-le-Troncy et 8 à Meaux-la-Montagne le 17 (ER).

Pipit rousseline : un migrateur le 27 à Soucieu (ER).

Bergeronnette des ruisseaux : signalée uniquement dans les Monts du Lyonnais et du Beaujolais, nicheurs probables (ER, MM, DS).

Bergeronnette printanière : 18 à Genas le 2, 3 le 14 et 2 le 28 à Miribel-Jonage (JMB), 6 à St-Andéol le 25 (DT).

Cincla plongeur : rarement cité dans nos chroniques, 1 à St-Clément-de-Vers le 19 et 1 à Aigueperse le 20 (ER).

Rougequeue à front blanc : un mâle à Marcy l'Etoile le 8 (FaD).

Tarier des prés : premier migrateur noté le 25 à Lentilly (DT).

Traquet motteux : migrateurs notés du 14 au 28 (DT, JMB, ER, PF, FaB).

Cisticole des joncs : 2 à Taluyers le 7 (ER) et 1 au Grand Large le 30 (CF).

Rousserolle turdoïde : 1 à Miribel-Jonage le 7 (JMB).

Fauvette mélanocéphale : cris de 2 ind. le 3 à Montagny (ER).

Pouillot fitis : premier migrateur le 6 à Haute-Rivoire (JJ).

Roitelet à triple bandeau : noté à Cublize, Meaux-la-Montagne, Thel, Ranchal, St-Bonnet-des-Bruyères (ER).

Gobemouche noir : migrateurs du 6 au 31 un peu partout (DT, JJ, ER, PF, JMB, PhP, VGS, MM).

Gobemouche gris : signalé à Mions (FaD) et dans les monts de l'ouest du département (JJ, ER, PF) du 7 au 26.

Pie-grièche écorcheur : notée à St-Andéol, Ste-Catherine, Genas, Taluyers, Joux, St-Martin-en-Haut, Haute-Rivoire, souvent avec juv. (ER, DT, JMB, ThM, CP, MBz, JGC, LR, JJ).

Grand Corbeau : cris d'un ind. en vol à St-Martin-en-Haut le 11 (ER, JGC, LR, MBz).

Bouvreuil pivoine : de 1 à 3 signalés uniquement dans les Monts du Lyonnais et du Beaujolais, nicheurs probables (ER).

Bruant ortolan : 1 mâle, 3 fem. et 5 juv. volants à Genas le 2 (JMB).

Bruant proyer : 1 le 9 et 1 le 12 à Soucieu (ER, MBz, Cp, ThM).



Septembre 2009

Septembre est le mois où la migration est la plus marquée, d'où bon nombre d'espèces dans cette chronique, mais déjà quelques oiseaux s'installant sans doute pour l'hiver, avec 850 **Fuligules milouins** et 136 **F. morillons** à Miribel-Jonage, où 185 **Nettes rousses** sont déjà comptées.

Cygne noir : 1 ind. signalé le 2 à Lyon sous le Pont Wilson (CF), revu ensuite plusieurs fois en amont de Lyon sur le Rhône.

Canard souchet : 2 ind. à Miribel-Jonage du 3 au 7 (JMB, CF), 2 à la gravière de Joux le 12 (DT, JPR).

Fuligule nyroca : 1 ind. plutôt précoce à Miribel-Jonage le 28 (JMB).

Caille des blés : une à l'envol à St-Sorlin le 12 (ER).

Grèbe à cou noir : 2 ind. au Grand Large le 3 (JMB).

Crabier chevelu : remarquable obs. d'un juv. posé dans une roselière de la gravière de Joux les 5 et 7 (JPR).

Aigrette garzette : 2 à Miribel-Jonage le 3 (JMB), 1 à Grigny le 11 (VGS) et à la gravière de Joux le 12 (JPR, DT).

Héron pourpré : 1 noté le 4 à Miribel-Jonage où l'espèce niche (CF).

Cigogne blanche : 1 posée à Corbas le 4 (VGS), 5 en vol à Lyon-Gerland le 8 (JMB) et 1 à Lentilly le 20 (MM).

Bondrée apivore : une seule donnée d'un ind. à La-Tour-de-Salvagny le 18 (FaD).

Circaète Jean-le-Blanc : un noté à Ville/Jarnioux le 5 (JPR) et à Bessenay le 6 (BD).

Milan royal : 3 en vol migratoire à Corbas le 8 (VGS).

Busard St-Martin : un ind. en vol à Chassagny le 11 et le 28 (ER).

Busard des roseaux : un ind. en migration le 6 à Décines (JMB) et à Dardilly (GBu).

Faucon hobereau : 1 ind. en vol le 3 au Grand Large (JMB), 1 à Arnas le 5 (JPR), 1 à Corbas les 8 & 17 (VGS), 2 à La-Tour-de-Salvagny le 18 (FaD) et 1 à Miribel-Jonage le 20 (JJ).

Faucon kobez : surprenante obs. d'un ind. posé à Mions le 21 (FaD, CF), l'espèce est plutôt vue à la migration pré-nuptiale.

Faucon pèlerin : 1 à Mions le 21 (FaD, CF).

Râle d'eau : 2 ind. entendus au Grand Large le 3 et à Miribel-Jonage les 3 & 7 (JMB), 3 à Meyzieu-le Rizan le 22 (JB).

Oedicnème criard : noté à Corbas (VGS), Ste-Consoce (DT), St-Andéol et St-Laurent-d'Agnay (ER), rassemblements de 30-50(?), puis une centaine à Arnas (JPR, DT), 41 puis 26, puis 59 à Brindas (PaM, ER), 9+13 puis 27 à Chassagny (ER), 3 puis 8 seulement à Lentilly (MM, DT).

Petit Gravelot : 2 à la gravière de Joux le 12 (DT, JPR).

Grand Gravelot : 1 à Miribel-Jonage le 20 (JJ).

Vanneau huppé : petits groupes (max. de 53 à St-Andéol) tout le mois à Arnas, Chazay, St-Andéol, Brindas, Miribel-Jonage (JPR, JMB, ER, CdA, MM, FaD, PaM).

Bécasseau minute : 3 à Miribel-Jonage le 3 (JMB).

Bécasseau cocorli : un juv. migrateur à Miribel-Jonage le 3 (JMB).

Bécasseau variable : 5 migrateurs le 20 à Miribel-Jonage (JJ).

Bécassine des marais : 1 à Arnas le 11 (JPR), 2 à la gravière de Joux le 12 (JPR, DT), jusqu'à 11 ind. à Miribel-Jonage tout le mois (JJ, JMB) et 2 à Taluyers le 27 (ER).

Bécasse des bois : une à l'envol à Monsols le 30 (ER).

Courlis cendré : cris à la gravière de Joux le 12 (JPR, DT).

Chevalier aboyeur : cri en vol le 12 à la gravière de Joux le 12 (DT, JPR).

Chevalier arlequin : 1 ind. à Miribel-Jonage le 28 (JMB).

Chevalier culblanc : 1 à Chassagny le 27 (ER).

Chevalier sylvain : 1 ind. à Miribel-Jonage le 7 (JMB).

Chevalier guignette : de 2 à 7 à Miribel-Jonage tout le mois (JMB, CF, JJ, DS, MaD), 3 au Grand Large le 2 (JMB), 2 à Arnas le 11 (JPR) et 2 à la gravière de Joux le 12 (DT, JPR).

Sterne pierregarin : 1 ind. au Grand Large le 2 (JMB), migrateur ou oiseau nicheur local ? Voir notre rubrique INFO ORNITHO dans l'Effraie n°27.

Guifette noire : 4 ind. en chasse au Grand Large le 2 et 1 les 7 & 8 (JMB), 1 à la gravière de Belleville le 11 (JPR).

Grand-duc d'Europe : noté dans les Monts du Lyonnais (ChV, ER).

Chevêche d'Athéna : notée à Corbas, Taluyers, Soucieu, St-Germain/l'Arbresle, La-Tour-de-Salvagny, St-Clément-les-Places, Pollionnay, Messimy, Irigny, Savigny (VGS, FaD, ChM, ChV, ER).

Chouette hulotte : chants signalés à Soucieu, St-Laurent-d'Agnay, St-Germain/l'Arbresle, St-Clément-les-Places, Pollionnay, Monsols (ER, ChV).

Engoulevent d'Europe : remarquable donnée de 3 juvéniles à l'envol le 1^{er} à Soucieu et 1 ind. en vol à St-Germain/l'Arbresle le 12 (ER).

Martinet à ventre blanc : 25 notés à Grigny le 8 (VGS), 100-120 le 11 (OI) à Gorge-de-Loup où il est noté aussi le 20 (JJ) ainsi qu'à Vaise et Tassin les 12 & 20 (ER).

Martin-pêcheur d'Europe : signalé à Arnas, Miribel-Jonage, Meyzieu, Irigny, St-Genis-Laval et sur l'Ile de la Table Ronde (DT, CF, JPR, JB, ER, JMB, MaD).

Guêpier d'Europe : max de 87 ad. et juv. à Miribel-J. le 3 (JMB, CF, JJ), signalé aussi à St-Andéol (ER, CdA, FaD).

Pic épeichette : 1 noté à St-Andéol, Brindas, Orliénas, Irigny et Miribel-Jonage (ER, PF, JMB).

Pic noir : noté à Ville/Jarnioux et Monsols (ER, JPR).

Hirondelle de rivage : 15 à Décines le 6 (JMB) et au moins 2 sous le Pont de la Guillotière à Lyon le 8 (DT).

Pipit des arbres : migrateurs notés du 5 au 28, avec un max de 20 à Miribel-Jonage (JMB, JPR, DT, ER, CF, VGS).

Pipit spioncelle : 7 ind. à Soucieu le 12 (ER).

Pipit rousseline : 2 migrateurs le 6 à Dardilly avec un **Pipit spioncelle** et une **Alouette calandrelle** (2^e obs. départementale si homologuée par le CHR) sur le site habituel du Carret (GBu).

Bergeronnette des ruisseaux : signalée du 12 au 28 à Lyon, Monsols, Mions, Thurins, St-Genis-Laval et Montagny (ER, MM, FaD, CF, JMB). Un vol migratoire de 22 ind. le 22 à Mions (CF, FaD).

Bergeronnette printanière : notée tout le mois à Dardilly, Arnas, Ste-Consorte, St-Andéol, Messimy et à Miribel-Jonage (ER, JPR, CF, DT, PF, JMB), max. de 52 à Miribel-Jonage le 7 (JMB).

Rougequeue à front blanc : quelques migrateurs (total de 12 oiseaux) tout le mois à Miribel-Jonage & Grand Large, Chazay et Lyon-Gerland (CF, MM, JJ, JMB).

Tarier des prés : 9 migrateurs notés le 3 au Grand Large et 10 à Décines le 7 (JMB), 1 à Soucieu le 12 (ER).

Traquet motteux : migrateurs notés du 3 au 20 avec 13 données pour 25 oiseaux (DT, JMB, ER, CF, JPR, VGS, FaB).

Bouscarle de Cetti : 3 au Grand Large le 3, 2 à Décines le 7 (JMB).

Rousserolle effarvatte : 4 ind. capturés et bagués le 7 à Décines (JMB).

Fauvette des jardins : une seule notée à Bessenay le 6 (BD).

Pouillot fitis : migrateurs notés du 5 au 28 avec 8 données pour 14 individus (BD, CF, JMB, ER).

Roitelet à triple bandeau : un seul noté à Chazay le 4 (MM).

Gobemouche noir : 28 données pour 76 ind. tout le mois un peu partout (ER, DT, JMB, MM, CF, JPR, JJ, PA, VGS).

Gobemouche gris : 2 notés à Miribel-Jonage le 7 et 2 à Gerland le 8 (JMB).

Pie-grièche écorcheur : une seule notée à Miribel-Jonage (JJ).


Grand Corbeau : 7 ind. en vol aux Haies le 11 (PA).

Bouvreuil pivoine : cris à Monsols le 30 (ER).

Beccroisé des sapins : cris entendus à Monsols le 30 (ER, PF).

Bruant ortolan : 4 ind. le 6 à Dardilly (GBu), 1 le 12 à Soucieu (ER) et 2 à La-Tour-de-Salvagny le 18 (FaD).

Bruant jaune : 2 à St-Andéol le 25 (ER).



Octobre 2009

Octobre est le mois d'arrivée des Rougegorges et des Accenteurs mouchets, entre autres petits passereaux qui viennent nous rendre visite pour l'hiver. A Miribel-Jonage, ce sont bien sûr plutôt les anatidés, 212 **Nettes rouges** sont comptées, déjà plusieurs milliers de **Foulques macroules** et de fuligules installés sans doute pour l'hiver.

Oie cendrée : 2 en vol à Décines le 10 (JMB) et 9 posées à Grigny le 29 (VGS).

Canard souchet : 3 ind. à Miribel-Jonage le 17 et 4 le 31 (JMB). L'espèce reste curieusement assez rare à Miribel.

Canard pilet : 1 femelle à Miribel-Jonage le 3 (JMB).

Canard siffleur : 3 ind. à Miribel-Jonage le 17 (DT, OR, JMB).

Fuligule nyroca : 1 ind. à Miribel-Jonage le 31 (JMB).

Grèbe à cou noir : 2 ind. à Miribel-Jonage le 31 (CdA).

Grande Aigrette : 1 à Vernaison le 14 et 1 à Grigny le 16 (VGS), 3 à Villefranche le 16 (AL) et 2 à St-Laurent-d'Agny le 24 (ER), toutes observées en vol, sauf la première !

Aigrette garzette : 1 à Grigny le 3 (VGS), 1 à Miribel-Jonage le 11 (JMB).

Cigogne blanche : 1 posée à Taponas le 11 (CF), bien tardive ou future hivernante ?...

Milan noir : encore 3 très tardifs le 20 à Ville/Jarnioux (JPR).

Milan royal : de 1 à 5 ind. notés en vol à Miribel-Jonage, aéroport St-Ex., Villefranche, Ville/Jarnioux, St-Symphorien-d'Ozon, Ecully, Longessaigne et Sarcey tout le mois (VGS, JMB, FaB, AL, JPR, CdA, HP, JJ, PYJ, MM, AFe, ChV).

Busard St-Martin : un ind. en chasse à Rontalon le 25 (ER).

Busard des roseaux : un ind. en migration le 4 à Miribel-Jonage (JMB).

Autour des palombes : 1 en vol le 19 à Longes (ER).

Faucon hobereau : 1 le 3 à Limonest (RF), 1 à Décines le 5 et à Genas le 10 (JMB), 1 à Monsols le 11 (JMB, NR, ER, CdA).

Faucon pèlerin : 1 en vol à Lyon-Gerland le 31 (JMB), 1 en vol le 10 (JJ) à Lyon Part-Dieu où il a peut-être niché cette année et où un nichoir a été posé en février 2010 (voir dans le numéro de *l'Effraie* n°28).

Rôle d'eau : 3 ind. entendus à Décines et à Miribel-Jonage (JMB), 1 à St-Symphorien-d'Ozon (CdA).

Oedicnème criard : rassemblements sur les sites habituels, 18 le 1^{er} à Chassagny (ER), 20 le 5, 9 le 11 et 3 le 31 à Brindas (ER, RC), 28 le 10 et 18 le 31 à Genas (JMB), 40 au moins le 11 à Arnas (JPR) ; sur le site de St-Priest, 100 le 3, 78+19 le 10, 134 le 17 (CF), 81+27 le 25 (DT), 100 le 31 (CF, RC), dont certains partis pour un record de présence dont on reparlera en novembre et même décembre !... A noter aussi 2 à Dardilly et 6 à Ste-Consoce le 31 (CF).

Grand Gravelot : 1 à Miribel-Jonage le 3 (JMB).

Pluvier argenté : exceptionnelle donnée (après celle d'août à Miribel-Jonage) d'un ind. le 11 à la gravière de Joux en plumage internuptial et à l'air épuisé (JPR).

Bécasseau variable : encore 7 migrateurs le 3 et 5 le 11 à Miribel-Jonage (JMB), 1 à la gravière de Joux le 11 (JPR).

Bécassine des marais : 1 à Arnas le 11 (JPR), 4 à Chaponost le 15 (ER), jusqu'à 13 à Miribel-Jonage du 3 au 16 (JMB).

Courlis cendré : 4 à Genas le 10 (JMB), 1 ind. à la gravière de Joux le 11 (JPR), 1 à St-Laurent-d'Agnay le 24 (ER).

Chevalier arlequin : 1 ind. à Miribel-Jonage le 11 (DT) et le 16 (JMB).

Chevalier guignette : de 1 à 9 à Miribel-Jonage (DT, OR, JMB), 3 à la Feyssine le 10 (DT), 1+3 à Arnas le 11 (JPR).

Effraie des clochers : nid trouvé à Messimy (ER).

Grand-duc d'Europe : noté sur plusieurs sites des Monts du Lyonnais (CdA, DA, ER, RC).

Chevêche d'Athéna : notée à La-Chapelle-sur-Coise, St-Christophe, Chaussan, Rontalon, Soucieu, Chaponost, Sarcey, Bully, Sourcieux, Pollionnay (ER, JMB, CF, MF, SéB, MéB, PiB, CyP). Trouvées écrasées à St-Julien/B. et Savigny (ChM).

Chouette hulotte : chants signalés à Monsols, Courzieu, Ternand, Rontalon, Ste-Catherine, St-André-la-Côte, Ste-Paule, St-Germain/l'Arbresle, Pollionnay, Chasselay et Ste-Foy-lès-Lyon (ER, JMB, MBz, CdA, FrT, AgT, VaH, GD). Loge trouvée à Gerland (JMB).

Martinet à ventre blanc : notés en petits groupes à Limonest, Lyon Croix-Rousse, Ste-Foy-lès-Lyon, Villefranche, Montagny, Taluyers (RF, BR, ER, AL, MBz, GD) et jusqu'à 120 à Vaise le 31 (OI).

Martin-pêcheur d'Europe : signalé à Irigny, Miribel-Jonage, la Feyssine, Montagny, au Parc de la Tête d'Or, tout le mois (JB, JMB, DT, OR, NR, CdA).

Pic épeichette : 1 noté à Montagny, Chassagny, St-Laurent-d'Agnay, Courzieu et Miribel-Jonage (ER, JMB).

Pic noir : noté à Irigny, Ste-Foy-lès-Lyon, St-Cyr-au-Mont-d'Or, Chasselay, Courzieu, St-Sorlin, Longes, Vaux-en-Beaujolais et Monsols (ER, CF, MF, JMB, CdA, NR, VGS, VaH, GD).

Pipit farlouse : arrivées et passages notés tout le mois, 32 données pour 212 ind. (ER, JMB, CF, MF, DT, PA, CdA, JJ, PYJ, MM, AFe, ChV).

Pipit des arbres : encore quelques migrateurs du 1^{er} au 28, avec 10 données pour 29 ind. (JMB, CdA, NR, CF, MF ER).

Pipit spioncelle : 2 ind. à Décines le 5 (JMB), 1 à Soucieu le 7 (ER), 3 à Genas le 11 (JMB), 1 à Lyon le 14 (ER), 1 à Villeurbanne le 25 (CdA, FrT) et 3 à Décines le 27 (JMB).

Bergeronnette des ruisseaux : 26 données pour 40 ind. arrivés de régions froides (JB, ER, JMB, CF, CdA, PA, AU).


Bergeronnette printanière : 3 le 10 à Genas, 4 le 16 à Mir.-J. (JMB), un groupe de 45 tardives le 30 à Cailloux (CdA).

Cincle plongeur : rarement cité, 1 à St-Christophe le 17 (JMB) et 2 à St-Jean-de-Touslas le 25 (PA).

Accenteur mouchet : 31 données pour 51 ind. tout le mois, arrivée d'oiseaux nordiques ou est-européens (RC, DT).

Traquet motteux : encore quelques migrateurs notés du 3 au 30 avec 4 données pour 8 oiseaux (RF, JMB, MM, CdA).

Grive litorne : les 2 premières notées à Chaponost le 14 (ER).



Grive mauvis : 3+3 ind. (les premières) à Miribel-Jonage le 31 (JMB).

Bouscarle de Cetti : de 1 à 3 au Grand Large et à Décines tout le mois (DT, JMB).

Rousserolle effarvatte : 1 ind. capturé et bagué le 10 à Décines (JMB).

Fauvette mélanocéphale : 6 contacts dans la lande à Montagny le 1^{er} (ER) et 1 à Soucieu le 23 (MBz).

Pouillot fitis : encore un le 19 à Longes (ER).

Roitelet à triple bandeau : noté à Monsols, Lissieu, Longes, Courzieu, Chasselay, St-Cyr-au-Mont-d'Or, Ste-Foy-lès-Lyon (RF, JMB, ER, CdA, VaH, GD).

Gobemouche noir : 6 ind. assez tardifs début octobre (jusqu'au 11) à Limonest (RF) et Miribel-Jonage (JMB).

Mésange boréale : 5 ind. à Monsols (JMB, CdA, ER, NR) et 1 à Courzieu (ER).

Rémiz penduline : 5 le 1à, 8+9 le 27 à Décines (JMB).

Pie-grièche grise : n'avait pas été notée dans le département depuis bien longtemps, une est à Genas le 31 (JMB).

Tarin des aulnes : premier signalé le 15 à Chaponost (ER).

Bouvreuil pivoine : cris à Yzeron, Thurins, Courzieu, Montromant (ER), 3 ind. à Monsols le 11 (CdA, JMB).

Bruant proyer : 18 à Chassagny le 4, 2 à Soucieu le 5, 13 à Grézieu-la-V. le 10 (ER), 3 à Genas le 11 (JMB).



Novembre 2009

Novembre est le mois d'arrivée des oiseaux qui viennent nous rendre visite pour l'hiver. A Miribel-Jonage, ce sont bien sûr plutôt les anatidés, **Nettes rouges**, **Sarcelles d'hiver**, **Canards chipeaux**, **une quinzaine de Canards siffleurs**, etc., les fuligules et déjà près de 9000 **Foulques macroules** installés sans doute pour l'hiver.

[**Cygne noir**] : l'individu d'octobre continue ses errances sur le Rhône, il est à Vernaison le 17 (VGS).

Canard souchet : 22 à Grigny le 6 (VGS), 9 le 20 à Miribel-Jonage (JMB) où l'espèce reste curieusement assez rare.

Fuligule nyroca : 1 ind. dès le 17 et le 20 à Miribel-Jonage (JMB).

Grèbe à cou noir : 1 ind. au Grand Large le 20 (JMB).

Milan royal : un ind. noté à Chazay le 5 (MM), à Miribel-Jonage le 11 (JPM, MC) et le 14 (AIM, JB).

Busard St-Martin : un ind. en chasse à Chassagny le 22 (RD, ER) et en vol à Pusignan le 28 (CdA).

Faucon émerillon : 1 chasse le 20 au Grand Large (JMB).

Faucon pèlerin : 1 en vol à Grigny le 25 (VGS), 1 posé à Colombier-Saugnieu le 28 (CdA), la femelle de Villefranche notée dès le 9 sur son pylône (capture de Mouettes rieuses), avec même un autre ind. les 10 & 12 (AL), 1 ind. posé le 1^{er} (JPF, DJT) à Lyon Part-Dieu où un nichoir a été posé en février 2010 (voir l'Effraie n°28).

Grue cendrée : une migratrice aux Chères (MM) et 2 à Mornant (ER) le 1^{er}.

Oedicnème criard : le rassemblement automnal sur le site de St-Priest continue tout novembre (CF, MaF) avec 54 ind. le 5 et encore 27 en fin de mois (voir l'Effraie n°28). Le record de date de séjour est déjà battu !

Vanneau huppé : des groupes sur le plateau mornantais (jusqu'à 52 le 1^{er}), à St-Maurice/Dargoire, à Brindas et à la gravière de Joux (GF, CF, JMB, PaM, JPR, ER).

Bécassine des marais : 1 seule est notée à Miribel-Jonage les 17 et 26 (JPR).

Bécasse des bois : 2 à Marchamp et 2 à Quincié le 16 (JPR) et une en vol à Sathonay le 8 (CdA).

Courlis cendré : encore un ind. à Soucieu le 7 (ER).

Chevalier guignette : 2 à Miribel-Jonage le 7 (DT), 1 à la gravière de Joux le 20 & le 26 (JPR, CF, JMB).

Goéland brun : 2 adultes à Miribel-Jonage le 20 (JMB).

Effraie des clochers : une seule signalée à Savigny le 29 (ER).

Grand-duc d'Europe : chants notés sur les Monts du Lyonnais et le Pilat (ER).

Chevêche d'Athéna : cris entendus à St-Jean-de-Touslas et aux Haies (ER, PA).

Chouette hulotte : chants signalés à Létra (AgT, FrT), Soucieu (MBz), Couzon et Curis-au-Mont-d'Or (JMB).

Martin-pêcheur d'Europe : signalé à Condrieu, Vernaison et Lyon (PA, VGS, CdA).

Pic épeichette : 1 noté à Villeurbanne, St-Marcel-l'Eclairé, Solaize et Vaugneray (ER, CdA, VGS).

Pic noir : noté à Ste-Paule, St-Laurent-d'Oingt, Dième, Caluire, Solaize et Charnay (JPR, JB, CdA, VGS).

Pipit des arbres : encore 3 migrateurs le 1^{er} à St-Jean-de-Touslas (ER) et 1 à St-Priest le 5 (CF).

Grive litorne : la première (et seule notée) à Cailloux le 11 (CdA).

Roitelet à triple bandeau : noté à St-Marcel-l'Eclairé, Couzon, Miribel-Jonage et Poleymieux (JMB, ER, CdA).

Tichodrome échelette : un ind. le 22 à Couzon, où il est assez régulier en hiver (JMB).

Rémiz penduline : cris entendus le 1^{er} à Miribel-Jonage où elle est migratrice rare, mais régulière (CdA, VaH).

Pie-grièche écorcheur : traces de lardoir sur un barbelé à Tassin (ER).

Pie-grièche grise : n'avait pas été notée dans le département depuis bien longtemps, encore une donnée le 22 à Echallas (PF) après celle d'octobre à Genas (JMB).

Pinson du Nord : curieusement, une seule donnée de 7 en vol le 7 à Soucieu (ER), il y en aura très peu cet hiver !

Bouvreuil pivoin : 3 ind. en vol à St-Marcel-l'Eclairé le 16 (ER).

Bruant proyer : 7 à Mornant le 1^{er}, 3 le 7 et 5 le 15 à Soucieu, 2 à Orliénas le 8 (ER), 15 à Joux (CF, JMB).

Bruant fou : 2 au Perréon le 25 (JPR).

Décembre 2009

Comme d'habitude, beaucoup de données viennent de Miribel-Jonage et du Grand Large, principal site d'observation des oiseaux en hiver (CdA, VaH, PC, JPR, JPM, JB, RC, HP, CF, MC, DT, OR, JMB) avec les espèces habituelles en nombre important du fait de la rigueur de cet hiver. **Foulques macroules** (max de 13000), **Fuligules milouins** (max de 4000) et **F. morillons** forment le gros des troupes avec les **Canards colverts** et **chipeaux** (max de 367), les **Nettes rousses** (max de 198), les **Sarcelles d'hiver** (max de 150 au moins). A noter la présence de 9 **Canards pilets** et seulement 4 **Canards souchets** le 22, quelques **Goélands cendrés** ainsi que de 15 à 40 **Canards siffleurs**. Les **Garrots à œil d'or** sont notés tout décembre (max de 11 ind.) et 7 **Tadornes de Belon** sont observés le 13 au Grand Large,

La froideur de cet hiver a amené plus d'oiseaux rares que de coutume, 2 **Fuligules milouinans** le 13 et 4 le 25, de 2 à 5 **Fuligules nyrocas**, 1 **Harle bièvre** dès le 12, 3 le 26 et max de 10 le 22, 1 **Harle piette** à partir du 24, quelques **Grèbes à cou noir**, 1 **Grèbe jougris** le 22 et quelques **Goélands bruns**, un **Plongeon imbrin** imm. (noté dès le 5) sera présent tout l'hiver au Grand Large - toutes obs. à soumettre au **CHR**. (Voir *l'Effraie* n°28).

Oie rieuse : 3 en vol à Miribel-Jonage le 6 (JMB).

Oie cendrée : un groupe de 12 en vol à Lyon le 2 (BoB) et de 20 en vol au Grand Large le 22 (JPM, MC).

[Canard mandarin] : 1 à Gerland le 25 (CF, CFr).

Canard siffleur : un oiseau à Arnas le 26 (XBC).

Macreuse brune : une à Bourdelan d'Anse le 27 (JPR).

Plongeon catmarin : 1 ind. à Bourdelan d'Anse le 27 (JPR).

Grèbe à cou noir : de 1 à 5 ind. au Grand Large et 2 à Miribel-Jonage, jusqu'au 20 (JMB, PC).

Grèbe jougris : 1 ind. à Miribel-Jonage le 22 (JMB).

Grande Aigrette : 1 à Marennes du 4 au 23 (RC), 1 à Grigny le 9 (VGS), 1 à Arnas le 15 (JPR) et un groupe de 12 en vol à Echallas le 19 (ER). (Voir *l'Effraie* n°28).


Autour des palombes : 1 à Aveize le 14 (JoV) et 1 en vol à Courzieu le 20 (ER).

Milan royal : un ind. noté à Miribel-Jonage, Theizé, Civrieux, Echallas (MM, MC, ER).

Busard St-Martin : obs. de 1 ou 2 ind. solitaires en chasse tout le mois, à St-Maurice/Dargoire, Echallas, Anse, Sourcieux, St-Cyr-le-Chatoux, St-Jean-de-Touslas, St-Symphorien-d'Ozon, St-André-la-Côte (PDC, PA, AIM, JPR, ER, MM, CdA, DT, VGS).

Faucon pèlerin : 1 en vol à Lyon le 12 (ER) et à Vernaison le 18 (VGS), 1 posé à Vénissieux le 12 (CF), la femelle de Villefranche notée tout le mois sur son pylône (mange un Pigeon domestique et une Bécasse) (AL), 1 ind. (H1) à St-Georges-de-Reneins le 26 (XBC), 1 ind. à Cailloux le 26 (CdA).

Grue cendrée : 4 migratrices très tardives le 18 à Chaponnay (RC).



Oedicnème criard : le rassemblement continue sur le site de St-Priest jusqu'au 15 (CF, JMB) (voir l'Effraie n°28). Le record de date de séjour est pulvérisé !

Vanneau huppé : encore 60 à St-Maurice/Dargoire le 10 (PDC), 7 à Belleville le 17 (CIR), 2 à St-Jean-de-Touslas le 19 (ER) et 2 à Arnas le 26 (XBC).

Bécassine des marais : de 2 à 4 notées à Miribel-Jonage et au Grand Large du 11 au 22 (JMB).

Bécasse des bois : 2 entendues à Chaponnay le 13 (JMB) et 1 mangée le 20 par le F. pèlerin de Villefranche (AL) !

Courlis cendré : encore 9 ind. à 26 à St-Georges-de-Reneins le 26 (XBC).

Chevalier guignette : de 1 à 2 tout le mois à Anse, Grigny et au Grand Large (JPR, VGS, JMB).

Chevalier culblanc : 2 à Arnas le 15 (JPR).

Goéland brun : 2 à 3 adultes et imm. à Miribel-Jonage ou au Grand Large tout le mois (JMB, PC).

[Perruche à collier] : 5 à Miribel-Jonage le 4 et 3 au Grand Large le 11 (JMB).

Grand-duc d'Europe : chants et parades notés sur les Monts du Lyonnais, les Monts d'Or et ailleurs (ER, MBz, MiP, CdA, GiT, RC, NZ, CIR, DrD, PDC).

Hibou moyen-duc : un couple paradant le 26 à Corbas (VGS).

Chevêche d'Athéna : cris entendus à Soucieu, Chazay, Polliionnay et Corbas (ER, MM, NZ, PeV).

Chouette hulotte : chants signalés à Rontalon, Rivolet, Vaugneray, Cogny, St-Maurice/Dargoire, Couzon et Curis-au-Mont-d'Or (ER, RC, GiT, XBC, JMB, CIR, PDC, DrD).

Martin-pêcheur d'Europe : signalé à Miribel-Jonage, Grand Large, Villeurbanne, Anse, et Arnas Condrieu, Vernaison et Lyon (PC, JMB, JPR, JB, VaS, XBC).

Pic noir : noté à Miribel-Jonage, St-Georges-de-Reneins et Arnas (JPR, XBC, JMB).

Pic mar : nouveau contact avec un oiseau au Parc de Lacroix-Laval le 26 (OW).

Pipit spioncelle : 8 à Arnas et au moins 2 à St-Georges-de-Reneins le 26 (XBC).

Cincla plongeur : un oiseau est noté à St-Genis-l'Argentière le 20 (ER).

Grive litorne : peu de citations, 60 à Echalas le 19 et 1 à Taluyers le 20 (ER), 2 à St-Cyr-le-Chatoux le 22 (CdA).

Grive mauvis : peu d'oiseaux, de 1 à 13 max. tout le mois à Miribel-Jonage, Quincié, Taluyers (ER, JMB, MC, JPM).

Roitelet à triple bandeau : noté à Loire/Rhône, Couzon, Courzieu, Rivolet (MBz, MiP, JMB, ER, CdA).

Mésange boréale : 1 à St-Martin-en-Haut le 19 et 3 à Courzieu le 20 (ER).

Pinson du Nord : aucune citation en décembre !

Bouvreuil pivoine : 1 ind. entendu à St-Martin-en-Haut le 19 (ER).

Bruant proyer : encore 3 le 20 à St-Laurent-d'Agnay (ER), 8 à Arnas et plus de 22 à St-Georges-de-R. le 26 (XBC).

Bruant fou : 3 à Pommiers le 15 et 1 à Quincié le 17 (JPR).

D.TISSIER



